

Tab. 1: Ergebnisse der Brutvogelkartierungen 2024 und Vergleich mit den Ergebnissen aus 2021, 2022 und 2023 an den Standorten, an denen Nisthilfen ausgebracht wurden.

Nachgewiesene Vogelarten sind alphabetisch nach deutschem Trivialnamen geordnet. Streng geschützte und bestandsgefährdete Arten in Fettschrift.

Der Brutstatus bezieht sich auf die Klassifizierung des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten ([Link](#)). In Klammern die Mindestzahl geschätzter/möglicher Brutpaare im Raum. Die hier vergebenen Brutzeitcodes bedeuten: Mögliches Brüten (A): A1 = Art zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt, A2 = Singendes, trommelndes oder balzendes Männchen zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt; Wahrscheinliches Brüten (B): B3 = Paar zur Brutzeit in geeignetem Bruthabitat festgestellt, B4 = Revierverhalten (Gesang, Kämpfe mit Reviernachbarn etc.) an mind. 2 Tagen im Abstand von mind. 7 Tagen am selben Ort lässt ein dauerhaft besetztes Revier vermuten, B5 = Balzverhalten (Männchen und Weibchen) festgestellt, B6 = Altvogel sucht einen wahrscheinlichen Nestplatz auf, B7 = Warn- oder Angstrufe von Altvögeln oder anderes aufgeregtes Verhalten, das auf ein Nest oder Junge in der näheren Umgebung hindeutet, B9 = Nest- oder Höhlenbau, Anlage einer Nistmulde u.ä. beobachtet; Sicheres Brüten (C): **C11a = benutztes Nest aus der aktuellen Brutperiode gefunden (bei der Säuberung), C11b = Eischalen geschlüpfter Jungvögel aus der aktuellen Brutperiode gefunden (bei der Säuberung)**, C12 = Eben flügge Jungvögel (Nesthocker) oder Dunenjunge (Nestflüchter) festgestellt, C13a = Altvögel verlassen oder suchen einen Nestplatz auf. Das Verhalten der Altvögel deutet auf ein besetztes Nest hin, das jedoch nicht eingesehen werden kann (hoch oder in Höhlen gelegene Nester), C14b = Altvogel mit Futter für die nicht-flüggen Jungen beobachtet, C16 = Junge im Nest gesehen oder gehört

Ob die Nisthilfen von einer Art angenommen wurden, zeigte sich durch Beobachtung bereits vor der Reinigung festgestellt (fütternde Altvögel); „potenziell“ bedeutet, dass die jeweilige Vogelart von den im Raum ausgebrachten Nisthilfen profitieren kann. Mehrere Arten können aufgrund ihrer Brutbiologie nicht mit den ausgebrachten Nisthilfen unterstützt werden.

Rote Liste-Status für das Saarland nach Roth et al. (2020): * = ungefährdet, V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht. In Klammern von Roth et al. (2020) geschätzte Brutpaare im Saarland.

Streng geschützte Arten sind entweder in dem Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie und/oder der Bundesartenschutzverordnung gelistet.

Standort	Vogelarten 2021	Vogelarten 2022	Vogelarten 2023	Vogelarten 2024	Brutstatus 2021 (BP)	Brutstatus 2022 (BP)	Brutstatus 2023 (BP)	Brutstatus 2024 (BP)	Nisthilfen 2024 angenomm en?	Rote Liste- Status (BP)	Streng ge- schützte Art?
Alsweiler (Bruchels- bach)	Insgesamt 30 Arten (27 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 29 Arten (26 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 29 Arten (28 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 17 Arten (17 mögliche bis sichere Brutvögel)							
Begehungen: N = 1 (während der Brutzeit)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	A1	B4 (2)	B4 (1) C11a / C13a (≥2)	A1	Freibrüter, potenziell in Halb- höhlen- kästen (Link)	* (80.000- 120.000)	Nein
07.03.2024 (danach lange Straßen- sperrung)	Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)				A1				Freibrüter, potenziell in Halb- höhlen- kästen (Link)	* (3.000- 6.000)	Nein
	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	B7 / C11a / C13a (≥3)	A2 / C11a (2)		A2 (1)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> (Link)	* (40.000- 60.000)	Nein
	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	A2 (1)	A2 (3)		B3 (3)	(Freibrüter auf Bäumen/in Hecken (Link))	* (50.000- 70.000)	Nein
	Buntspecht (<i>Dendro- copos major</i>)		Buntspecht (<i>Dendro- copos major</i>)	Buntspecht (<i>Dendro- copos major</i>)	A1			A2 (1)	(eigene Specht- höhlen (Link))	* (4.000- 8.000)	Nein

	Dorn-grasmücke (<i>Sylvia communis</i>)	Dorn-grasmücke (<i>Sylvia communis</i>)			A2 (1)	A2 (1)			(Hecken-brüter [Link])	* (10.000-18.000)	Nein
	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)		A1	A1	A1		(Freibrüter, meist hoch in Bäumen [Link])	* (3.500-7.000)	Nein
	Elster (<i>Pica pica</i>)				A1				(Freibrüter in Bäumen [Link])	* (5.000-8.000)	Nein
	Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)		Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel		(Freibrüter in Nadel-bäumen [Link])	* (10-100)	Nein
	Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)		Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)				A2 (1)		(brütet meist am Boden [Link])	* (6.000-10.000)	Nein
		Garten-baum-läufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)	Garten-baum-läufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)	Garten-baum-läufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)		A2 (3)	A2 (1)	A2 (1)	Nest hinter loser Rinde / in Baum-spalten [Link] , spezielle Nisthilfen [Link]	* (5.000-10.000)	Nein
	Gartengras-mücke (<i>Sylvia borin</i>)				A2 (1)				(Hecken-brüter [Link])	* (10.000-17.000)	Nein
			Gebirgs-stelze (<i>Motacilla cinerea</i>)	Gebirgs-stelze (<i>Motacilla cinerea</i>)			A2 (1)	A1	(brütet frei in Ufernähe [Link])	* (500-1.500)	Nein

	Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)		Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)		B3 (1)		B3 (1)		(Freibrüter, meist in Nadel- bäumen [Link])	* (2.000- 7.000)	Nein
	Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)	Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)	Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)		B3 /B4 (2-3)	A1	A2 (1)		(Boden- brüter in dichter Vegetation oder niedrig in Hecken [Link])	* (10.000- 20.000)	Nein
		Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)			Nahrungs- gast	Nahrungs- gast		(Kolonie- brüter in alten Bäumen [Link])	* (200-250)	Nein
		Grau- schnäpper (<i>Muscicapa striata</i>)		Grau- schnäpper (<i>Muscicapa striata</i>)		C11a (1)		C11a (1)	Freibrüter, Halb- höhlen- kasten, Annahme [Link]	* 1.000-2.000	Nein
	Grauspecht (<i>Picus canus</i>)				A2 (1)				(Bau eigener oder Adaption be- stehender Specht- höhlen [Link])	1 (30-80)	Ja
	Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)		B3 / B4 (1)	A2 (1)	A2 (1)		(Brut meist in verlassenen Specht-	* (1.000- 2.000)	Ja

								höhlen [Link]		
	Haus- rotschwanz (<i>Phoeni- curus ochruros</i>)				Gastvogel			(Höhlen- brüter, aber meist an Gebäuden [Link])	* (10.000- 20.000)	Nein
		Hecken- braunelle (<i>Prunella modularis</i>)				A2 (1)		(meist Hecken- brüter [Link])	* 15.000- 30.000)	Nein
		Kernbeißer (<i>Cocco- thraustes cocco- thraustes</i>)	Kernbeißer (<i>Cocco- thraustes cocco- thraustes</i>)	Kernbeißer (<i>Cocco- thraustes cocco- thraustes</i>)		B4 (1-2)	A2 (1)	(brütet frei, meist hoch in Laub- bäumen [Link])	* (1.000- 3.000)	Nein
	Klapper- grasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)		Klapper- grasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)		A2 (1)		B4 (1-2)	(Hecken- brüter [Link])	* (2.000- 6.000)	Nein
	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	B4 (2)	A2 / C11a (3)	C11a / C13a (≥3)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> [Link]	* (10.000- 20.000)	Nein
	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	B4 / C11a (≥3)	B7 / C11a (≥3)	C11a / C13a (≥3)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> [Link]	* (60.000- 100.000)	Nein
	Mäuse- bussard (<i>Buteo buteo</i>)	Mäuse- bussard (<i>Buteo buteo</i>)	Mäuse- bussard (<i>Buteo buteo</i>)		A1	A1	A1	(Horst hoch in Bäumen [Link])	* (800-1.600)	Ja
			Mandarin- ente (<i>Aix galeri- culata</i>)				B9 (1)	Höhlen- brüter in Baum-	Etabliertes Neozoon (5-15)	Nein

								höhlen [Link]		
		Mittel- specht (<i>Dendro- copos medius</i>)	Mittel- specht (<i>Dendro- copos medius</i>)			A1	A2 (1)	(eigene Specht- höhlen [Link])	* (1.000- 1.500)	Ja
		Mistel- drossel (<i>Turdus viscivorus</i>)				A1		(brütet frei, meist in Nadel- bäumen [Link])	* 1.000- 3.000)	Nein
	Mönchs- grasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Mönchs- grasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Mönchs- grasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)		B4 (1-2)	B4 (2)	A2 (1)	(Hecken- brüter [Link])	* (30.000- 70.000)	Nein
		Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)				A1		(Freibrüter, hoch in Bäumen [Link])	* (5.000- 10.000)	Nein
	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)		Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	B4 (1)		B4 (1-2)	(brütet frei, meist in Bäumen [Link])	* (15.000- 25.000)	Nein
	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	B4 / C11a (1)	A2 (2)	B4 (2-3)	Freibrüter, Halb- höhlen- kasten, <u>Annahme</u> [Link]	* (40.000- 60.000)	Nein
		Schwanz- meise (<i>Aegithalos caudatus</i>)	Schwanz- meise (<i>Aegithalos caudatus</i>)			A1	B3 (1)	(Kugelnest in Bäumen oder Hecken [Link])	* (2.000- 4.000)	Nein

		Schwarz- specht (<i>Dryocopus martius</i>)	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)			außerhalb der Brutzeit	A2 (3)		(eigene Specht- höhlen [Link])	* (250-500)	Ja	
	Silberreiher (<i>Casmero- dius albus</i>)				Gastvogel					(Kolonien in Schilf- beständen [Link])	im Saarland kein Brutvogel	Ja
	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)			A2 (1)	A2 (3)			(brütet frei, meist in Nadel- bäumen [Link])	* (10.000- 20.000)	Nein	
	Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)				A1				(Horst meist in Nadel- bäumen [Link])	* (300-500)	Ja	
	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)				A1				Höhlen- brüter, potenziell [Link]	* (25.000- 40.000)	Nein	
		Stockente (<i>Anas platy- rhynchos</i>)		Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)				B3 (2)	A2 (1)		(Boden- brüter [Link])	* (2.000- 4.000)
	Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)		Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)		B4 (1-2)		A2 (2)	Höhlen- brüter, potenziell [Link]		* (5.000- 15.000)	Nein	
	Tannen- meise (<i>Parus ater</i>)	Tannen- meise (<i>Parus ater</i>)	Tannen- meise (<i>Parus ater</i>)		A2 (1)	A2 (1)	A2 (1)	Höhlen- brüter, potenziell [Link]		* (8.000- 15.000)	Nein	
		Trauer- schnäpper	Trauer- schnäpper	Trauer- schnäpper		C11a (1)	C11a (3)	C11a (1)	Höhlen- brüter,	3 (500-1.500)	Nein	

		(<i>Ficedula hypoleuca</i>)	(<i>Ficedula hypoleuca</i>)	(<i>Ficedula hypoleuca</i>)					<u>Annahme</u> (Link)		
				Weiden- meise (<i>Poecile montanus</i>)				B3 (1)	Höhlen- brüter, potenziell, aber zimmert sich meistens ihre eigenen Höhlen (Link)	* (2.000- 6.000)	Nein
	Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	B4 (1-2)	B4 (1-2)	B4 (2-3)	A2 (3)	(verstecktes Kugelnest (Link), spezielle Nisthilfen erhältlich (Link))	* (25.000- 50.000)	Nein
	Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)		B4 (1-2)	B4 (1)	B4 (2-3)		(Kugelnest in Boden- vegetation (Link))	* (30.000- 70.000)	Nein
Berschweiler (Rohrbach)	Insgesamt 22 Arten (18 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 25 Arten (23 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 37 Arten (33 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 33 Arten (29 mögliche bis sichere Brutvögel)							
Begehungen: N = 5 (3 während der Brutzeit)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	B4 (1)	A2 (1)	A2 (1-2)	B4 (3-4)	Freibrüter, potenziell in Halb- höhlen-	* (80.000- 120.000)	Nein

								kästen (Link)		
28.03.2024, 09.04.2024, 03.06.2024, (28.09.2024) (27.11.2024)	Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)		Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)	Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)	A1		A1	Freibrüter, potenziell in Halb- höhlen- kästen (Link)	* (3.000- 6.000)	Nein
	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	A2 (2)	B4 (2)	B4 (2-3)	Höhlen- brüter, potenziell (Link)	* (40.000- 60.000)	Nein
	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	B4 (1)	B4 (1)	B4 (3-4)	(Freibrüter auf Bäumen/in Hecken (Link))	* (50.000- 70.000)	Nein
	Buntspecht (<i>Dendro- copos major</i>)	Buntspecht (<i>Dendro- copos major</i>)	Buntspecht (<i>Dendro- copos major</i>)	Buntspecht (<i>Dendro- copos major</i>)	außerhalb der Brutzeit	B4 (1)	A2 (1-2)	(eigene Specht- höhlen (Link))	* (4.000- 8.000)	Nein
	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	A1	A1	A1	(Freibrüter, meist hoch in Bäumen (Link))	* (3.500- 7.000)	Nein
				Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)			A1	(Brut- höhlen in Steilufern (Link), potenziell auch im Gebiet möglich)	* (100-200)	Ja
		Elster (<i>Pica pica</i>)	Elster (<i>Pica pica</i>)			A1	A1	(Freibrüter in Bäumen (Link))	* (5.000- 8.000)	Nein

	Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)		Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	Gastvogel	Gastvogel		Gastvogel	(Freibrüter in Nadel- bäumen [Link])	* (10-100)	Nein
			Feldlerche (<i>Alauda arvensis</i>)				A2 (1)		(Boden- brüter [Link])	V (6.000- 12.000)	Nein
		Garten- baum- läufer (<i>Certhia brachy- dactyla</i>)	Garten- baum- läufer (<i>Certhia brachy- dactyla</i>)	Garten- baum- läufer (<i>Certhia brachy- dactyla</i>)		A2 (1)	B4 (1)	A2 (2)	Nest hinter loser Rinde/in Baum- spalten ([Link]), spezielle Nisthilfen ([Link])	* (5.000- 10.000)	Nein
			Garten- grasmücke (<i>Sylvia borin</i>)				A2 (1)		(Hecken- brüter [Link])	* (10.000- 17.000)	Nein
	Gebirgs- stelze (<i>Motacilla cinerea</i>)	Gebirgs- stelze (<i>Motacilla cinerea</i>)	Gebirgs- stelze (<i>Motacilla cinerea</i>)		außerhalb der Brutzeit	B3 (1)	C11a (1)		brütet in Ufernähe, <u>Annahme</u> [Link])	* (500-1.500)	Nein
			Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)				A1		(Freibrüter, meist in Nadel- bäumen [Link])	* (2.000- 7.000)	Nein
		Grünfink (<i>Carduelis chloris</i>)				A1			(Freibrüter, meist in Hecken [Link])	* (10.000- 15.000)	Nein
	Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)		Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)		B4 (1)		A2 (1)		(Boden- brüter in dichter	* (10.000- 20.000)	Nein

									Vegetation oder niedrig in Hecken [Link])		
			Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)			C11a / C12 (1)	A1	(Kolonie- brüter in alten Bäumen [Link])	* (200-250)	Nein
	Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)		Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	A2 (1)	B4 (1)		B4 (1-2)	(Brut meist in verlassenen Specht- höhlen [Link])	* (1.000- 2.000)	Ja
			Kanadagans (<i>Branta canadensis</i>)	Kanadagans (<i>Branta canadensis</i>)			B3 (1)	C11a (2)	(Boden- brüter [Link] , am Fisch- weiher)	Etabliertes Neozoon (40-60)	Nein
			Kernbeißer (<i>Cocco- thraustes cocco- thraustes</i>)	Kernbeißer (<i>Cocco- thraustes cocco- thraustes</i>)			A2 (1)	B3 (3)	(brütet frei, meist hoch in Laub- bäumen [Link])	* (1.000- 3.000)	Nein
	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	A2 (1)	C11a / C13a (1)	B4 (1)	B9 (3-4)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> [Link]	* (10.000- 20.000)	Nein
	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	A2 (3)	C11a, C12 (1)	B7 (3-4)	C12 (4-5)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> [Link]	* (60.000- 100.000)	Nein
	Kolkrabe (<i>Corvus corax</i>)	Kolkrabe (<i>Corvus corax</i>)			Nahrungs- gast	Nahrungs- gast			(Horst meist auf	* (15-30)	Nein

			Mäuse- bussard (<i>Buteo buteo</i>)				A1		Bäumen [Link])			
		Mäuse- bussard (<i>Buteo buteo</i>)		Mäuse- bussard (<i>Buteo buteo</i>)		A1		B7 (1)	(Horst hoch in Bäumen [Link])	* (800-1.600)	Ja	
				Mistel- drossel (<i>Turdus viscivorus</i>)	Mistel- drossel (<i>Turdus viscivorus</i>)			A2 (1)	A2 (1)	(brütet frei, meist in Nadel- bäumen [Link])	* 1.000- 3.000)	Nein
	Mittel- specht (<i>Dendro- copos medius</i>)	Mittel- specht (<i>Dendro- copos medius</i>)	Mönchs- grasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Mittel- specht (<i>Dendro- copos medius</i>)	A1	A2 (1)	B4 (3-4)	A2 (2)	(eigene Specht- höhlen [Link])	* (1.000- 1.500)	Ja	
		Mönchs- grasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)		Mönchs- grasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)		B4 (≥2)		B4 (5-6)	(Hecken- brüter [Link])	* (30.000- 70.000)	Nein	
		Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)		Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)		A1		B5 (1)	(Freibrüter, hoch in Bäumen [Link])	* (5.000- 10.000)	Nein	
			Rauch- schwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)				Nahrungs- gast		(Nester meist in Stallungen [Link])	3 (3.000- 6.000)	Nein	
	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)		Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	B4 (1)			B4 (2)	B4 (2-3)	(brütet frei, meist in Bäumen [Link])	* (15.000- 25.000)	Nein
	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	B4 (1)	B4 (≥2)		C12 (3-4)	C12 (7-8)	Freibrüter, potenziell in Halb- höhlen-	* (40.000- 60.000)	Nein

									kästen (Link)		
			Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)				Nahrungs- gast		(Horst meist in alten Bäumen Link)	* (80-100)	Ja
			Schwanz- meise (<i>Aegithalos caudatus</i>)				A1		(Kugelnest in Bäumen oder Hecken Link)	* (2.000- 4.000)	Nein
			Schwarz- specht (<i>Dryocopus martius</i>)	Schwarz- specht (<i>Dryocopus martius</i>)			außerhalb der Brutzeit	A2 (1)	(eigene Specht- höhlen Link)	* (250-500)	Ja
				Schwarz- storch (<i>Ciconia nigra</i>)				Nahrungs- gast	(Horst in hohen alten Bäumen Link)	* (1-5)	Ja
			Silberreiher (<i>Casmero- dius albus</i>)	Silberreiher (<i>Casmero- dius albus</i>)			Gastvogel	Gastvogel	(Kolonien in Schilf- beständen Link)	im Saarland kein Brutvogel	Ja
	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	B4 (2)	A2 (1)	B4 (3)	B4 (1-2)	(brütet frei, meist in Nadel- bäumen Link)	* (10.000- 20.000)	Nein
			Sommer- gold- hähnchen (<i>Regulus ignicapillus</i>)	Sommer- gold- hähnchen (<i>Regulus ignicapillus</i>)			A2 (1)	A2 (1)	(Kugelnest, meist in Bäumen Link)	* (10.000- 20.000)	Nein

	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	C11a / C16 (3)	A2 / C11a (≥1)	A2 (2)	C16 (2)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> [Link]	* (25.000- 40.000)	Nein
			Stockente (<i>Anas platy- rhynchos</i>)	Stockente (<i>Anas platy- rhynchos</i>)			C12 (1-2)	B3 (1)	(Boden- brüter [Link])	* (2.000- 4.000)	Nein
	Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)	Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)	Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)		A2 (1)	A2 / C11a (2)	A1	A2 (1)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> [Link]	* (5.000- 15.000)	Nein
				Tannen- meise (<i>Parus ater</i>)				A2 (1)	Höhlen- brüter, potenziell [Link]	* (8.000- 15.000)	Nein
	Weiden- meise (<i>Poecile montanus</i>)				A2 (1)				Höhlen- brüter, potenziell, aber zimmert sich meistens ihre eigenen Höhlen [Link]	* (2.000- 6.000)	Nein
	Wintergold- hähnchen (<i>Regulus regulus</i>)	Wintergold- hähnchen (<i>Regulus regulus</i>)	Wintergold- hähnchen (<i>Regulus regulus</i>)	Wintergold- hähnchen (<i>Regulus regulus</i>)		A2 (1)	A2 (1)	A2 (2)	(Kugelnest in Nadel- bäumen [Link])	* (10.000- 20.000)	Nein
	Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	A2 (1)	B4 (≥2)	B4 (3)	B4 (4-5)	(verstecktes Kugelnest [Link] , spezielle Nisthilfen	* (25.000- 50.000)	Nein

									erhältlich [Link]		
	Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	A2 (1)	B4 (≥2)	B4 (3)	B4 (4-5)	(Kugelnest in Boden- vegetation [Link])	* (30.000- 70.000)	Nein
Berschweiler (Schulland- heim)	Insgesamt 58 Arten (46 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 51 Arten (37 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 45 Arten (36 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 39 Arten (34 mögliche bis sichere Brutvögel)							
Begehungen: N = 5 (4 während der Brutzeit)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	B9 (1)	A2 (3)	C14b (≥2)	B4 (5-6)	Freibrüter, potenziell in Halb- höhlen- kästen [Link]	* (80.000- 120.000)	Nein
26.02.2024, 24.05.2024, 03.06.2024, 12.06.2024, (15.11.2024)		Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)	Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)			C13a (1)	A1		Freibrüter, potenziell in Halb- höhlen- kästen [Link]	* (3.000- 6.000)	Nein
	Bergfink (<i>Fringilla monti-fringilla</i>)	Bergfink (<i>Fringilla monti-fringilla</i>)			Gastvogel	Gastvogel			(brütet frei in Bäumen und Sträuchern [Link])	Im Saarland kein Brutvogel	Nein
	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	C11ab / C13a (3)	B4 /C11ab (≥1)	C11a / C13a (≥3)	C11a (≥1)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> [Link]	* (40.000- 60.000)	Nein

	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	A2 (2)	B4 (≥2)	B4 (≥3)	B4 (8-9)	(Freibrüter auf Bäumen/in Hecken [Link])	* (50.000-70.000)	Nein
	Buntspecht (<i>Dendrocopos major</i>)	Buntspecht (<i>Dendrocopos major</i>)	Buntspecht (<i>Dendrocopos major</i>)	Buntspecht (<i>Dendrocopos major</i>)	B4 (2)	A1	A1	C16 (2-3)	(eigene Spechthöhlen [Link])	* (4.000-8.000)	Nein
	Dorngrasmücke (<i>Sylvia communis</i>)				B4 (1)				(Heckenbrüter [Link])	* (10.000-18.000)	Nein
	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	B4 (?)	A1	A1	A1	(Freibrüter, meist hoch in Bäumen [Link])	* (3.500-7.000)	Nein
	Elster (<i>Pica pica</i>)	Elster (<i>Pica pica</i>)			A1	A1			(Freibrüter in Bäumen [Link])	* (5.000-8.000)	Nein
	Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	(Freibrüter in Nadelbäumen [Link])	* (10-100)	Nein
		Fichtenkreuzschnabel (<i>Loxia curvirostra</i>)				Gastvogel			(Freibrüter in Nadelbäumen [Link])	* (50-200)	Nein
	Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)				B4 (1)				(brütet meist am Boden [Link])	* (6.000-10.000)	Nein
	Gartenbaumläufer	Gartenbaumläufer	Gartenbaumläufer	Gartenbaumläufer	C13a (4)	A2 (1-2)	C13a (≥1)	B4 (3-4)	Nest hinter loser Rinde/in	* (5.000-10.000)	Nein

	<i>(Certhia brachydactyla)</i>	<i>(Certhia brachydactyla)</i>	<i>(Certhia brachydactyla)</i>	<i>(Certhia brachydactyla)</i>					Baumspalten (Link), spezielle Nisthilfen (Link)		
	Garten-grasmücke (<i>Sylvia borin</i>)		Garten-grasmücke (<i>Sylvia borin</i>)	Garten-grasmücke (<i>Sylvia borin</i>)	A2 (1)		B4 (1)	A2 (1)	(Heckenbrüter Link)	* (10.000-17.000)	Nein
		Gartenrotschwanz (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	Gartenrotschwanz (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	Gartenrotschwanz (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)		B4 / C11ab (1)	B4 (1)	A2 (1)	Höhlen- und Halbhöhlenbrüter, <u>Annahme</u> Link	* (2.000-5.000)	Nein
	Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)		A1	B3 (1)	A1		(Freibrüter, meist in Nadelbäumen Link)	* (2.000-7.000)	Nein
	Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)	Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)	Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)	Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)	B4 (2)	B4 (1-2)	A2 (1)	A2 (2)	(Bodenbrüter in dichter Vegetation oder niedrig in Hecken Link)	* (10.000-20.000)	Nein
	Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	Nahrungsgast	Nahrungsgast	Nahrungsgast	Nahrungsgast	(Koloniebrüter in alten Bäumen Link)	* (200-250)	Nein
	Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	B4 (2)	B4 (1-2)	B4 (2)	B4 (1-2)	(Brut meist in verlassenen Specht-	* (1.000-2.000)	Ja

								höhlen [Link]		
		Habicht (<i>Accipiter gentilis</i>)			A1			(Horst meist hoch auf Nadel- bäumen [Link])	* (50-100)	Ja
	Hauben- meise (<i>Parus cristatus</i>)	Hauben- meise (<i>Parus cristatus</i>)	Hauben- meise (<i>Parus cristatus</i>)		A1		außerhalb der Brutzeit	Höhlen- brüter, potenziell (Link)	* (2.000- 5.000)	Nein
	Haus- rotschwanz (<i>Phoeni- curus ochruros</i>)				A2 (1)			(Höhlen- brüter, aber meist an Gebäuden [Link])	* (10.000- 20.000)	Nein
	Hecken- braunelle (<i>Prunella modularis</i>)				B4 (1-2)			(meist Hecken- brüter [Link])	* 15.000- 30.000)	Nein
	Hohltaube (<i>Columba oenas</i>)	Hohltaube (<i>Columba oenas</i>)	Hohltaube (<i>Columba oenas</i>)	Hohltaube (<i>Columba oenas</i>)	B4 (3)	A2 (1-2)	A2 (1)	Höhlen- brüter, z.B. in verlassenen Specht- höhlen (Link), spezielle bzw. Waldkauz- stkästen (Link)	* (400-800)	Nein
	Jagdfasan (<i>Phasianus colchicus</i>)			Jagdfasan (<i>Phasianus colchicus</i>)	B4 (1)			(Boden- brüter [Link])	Etabliertes Neozoon (1.000- 3.000)	Nein

	Kernbeißer (<i>Cocco-thraustes cocco-thraustes</i>)	Kernbeißer (<i>Cocco-thraustes cocco-thraustes</i>)	Kernbeißer (<i>Cocco-thraustes cocco-thraustes</i>)	Kernbeißer (<i>Cocco-thraustes cocco-thraustes</i>)	B4 (2-3)	B4 (1-2)	A2 (2)	A2 (1-2)	(brütet frei, meist hoch in Laubbäumen [Link])	* (1.000-3.000)	Nein
	Klappergrasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)	Klappergrasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)	Klappergrasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)	Klappergrasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)	B4 (1)	B4 (1)	B4 (1)	B4 (1)	(Heckenbrüter [Link])	* (2.000-6.000)	Nein
	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	B4 (3)	B4 (≥1)	C11a, B9 (5-6)	B4 (2-3)	Höhlenbrüter, Annahme [Link]	* (10.000-20.000)	Nein
	Kleinspecht (<i>Dendrocopos minor</i>)				A2 (1)				(eigene Spechthöhlen in morschen Bäumen [Link])	V (250-500)	Nein
	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	B4 / C11ab (2)	C11ab / C13a (≥2)	C11a / C13a (≥6)	C11a (≥2)	Höhlenbrüter, Annahme [Link]	* (60.000-100.000)	Nein
	Kolkrabe (<i>Corvus corax</i>)	Kolkrabe (<i>Corvus corax</i>)	Kolkrabe (<i>Corvus corax</i>)		Nahrungsgast	Nahrungsgast	A2 (1)		(Horst meist auf Bäumen [Link])	* (15-30)	Nein
	Kuckuck (<i>Cuculus canorus</i>)				A2 (1)				(Brutparasit [Link])	2 (100-300)	Nein
	Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)	Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)	Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)	Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)	C12 (1)	C12 (1)	C12 (1)	C12 (1)	(Horst hoch in Bäumen [Link])	* (800-1.600)	Ja

	Mehlschwalbe (<i>Delichon urbicum</i>)	Mehlschwalbe (<i>Delichon urbicum</i>)			Nahrungsgast	Nahrungsgast			(Lehm-nester meist an Gebäuden [Link] , spezielle Nisthilfen erhältlich [Link])	3 (6.000-12.000)	Nein
	Misteldrossel (<i>Turdus viscivorus</i>)	Misteldrossel (<i>Turdus viscivorus</i>)	Misteldrossel (<i>Turdus viscivorus</i>)	Misteldrossel (<i>Turdus viscivorus</i>)	B4 (2)	B4 (2)	B4 (2)	B4 (1-2)	(brütet frei, meist in Nadelbäumen [Link])	* 1.000-3.000	Nein
	Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>)	Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>)	Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>)	Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>)	B4 (2-3)	B4 (2-3)	B4 (1-2)	A2 (1)	(eigene Spechthöhlen [Link])	* (1.000-1.500)	Ja
	Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	A2 (1-2)	B4 (4)	B4 (≥3)	B4 (7-8)	(Heckenbrüter [Link])	* (30.000-70.000)	Nein
				Nilgans (<i>Alopochen aegyptiaca</i>)				Nahrungsgast	(Bruten am Boden, auf Bäumen und in Baumhöhlen [Link])	Etabliertes Neozoen (20-60)	Nein
	Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)				C12 (1)				(Heckenbrüter [Link])	* (1.000-2.000)	Ja
	Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)	Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)	Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)		A1	A1	A1		(Freibrüter, hoch in	* (5.000-10.000)	Nein

									Bäumen [Link])			
	Rauch- schwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)	Rauch- schwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)			Rauch- schwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)	Nahrungs- gast		Nahrungs- gast	Nahrungs- gast	(Nester meist in Stallungen [Link])	3 (3.000- 6.000)	Nein
				Ringdrossel (<i>Turdus torquatus</i>)					Rastvogel	(Nischen- Freibrüter [Link])	im Saarland kein Brutvogel	Nein
	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	B4 (1-2)	A2 (5)	B4 (2-3)	B4 (4)	(brütet frei, meist in Bäumen [Link])	* (15.000- 25.000)	Nein	
	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	A2 (?)	A2 (≥1)	B4, C12 (1-2)	C12 (6-7)	Freibrüter, potenziell in Halb- höhlen- kästen [Link])	* (40.000- 60.000)	Nein	
	Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)	Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)	Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)		Nahrungs- gast	Nahrungs- gast	Nahrungs- gast		(Horst meist in alten Bäumen [Link])	* (80-100)	Ja	
	Schwanz- meise (<i>Aegithalos caudatus</i>)	Schwanz- meise (<i>Aegithalos caudatus</i>)	Schwanz- meise (<i>Aegithalos caudatus</i>)	Schwanz- meise (<i>Aegithalos caudatus</i>)	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	A2 (1)	(Kugelnest in Bäumen oder Hecken [Link])	* (2.000- 4.000)	Nein	
			Schwarz- milan (<i>Milvus migrans</i>)				Nahrungs- gast		(Horst meist in alten Bäumen [Link])	* (25-50)	Ja	
	Schwarz- specht	Schwarz- specht	Schwarz- specht	Schwarz- specht	B5 (1)	A1	A2 (≥1)	A2 (1)	(eigene Specht-	* (250-500)	Ja	

	(<i>Dryocopus martius</i>)	(<i>Dryocopus martius</i>)	(<i>Dryocopus martius</i>)	(<i>Dryocopus martius</i>)			B4 (2)		höhlen [Link])			
	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	B4 (2)	B4 (≥1)		B4 (3-4)	(brütet frei, meist in Nadel- bäumen [Link])	* (10.000- 20.000)	Nein	
	Sommer- gold- hähnchen (<i>Regulus ignicapillus</i>)		Sommer- gold- hähnchen (<i>Regulus ignicapillus</i>)	Sommer- gold- hähnchen (<i>Regulus ignicapillus</i>)	A2 (2)			B4 (2-3)	(Kugelnest, meist in Bäumen [Link])	* (10.000- 20.000)	Nein	
	Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)	Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)			A1	außerhalb der Brutzeit	A2 (1)		(Horst meist in Nadel- bäumen [Link])	* (300-500)	Ja	
	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)		Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	C16 (1)		A2 (≥1)	A2 (1)	Höhlen- brüter, potenziell [Link]	* (25.000- 40.000)	Nein
	Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)					B4 (1-2)				(Freibrüter in Gehölzen [Link])	* (2.000- 5.000)	Nein
	Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)	Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)	Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)	Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)	B4 (3)	A2 / C11a (≥2)	A2 / C11a (≥2)	A2 (1)	Höhlen- brüter, Annahme [Link]	* (5.000- 15.000)	Nein	
	Tannen- meise (<i>Parus ater</i>)	Tannen- meise (<i>Parus ater</i>)	Tannen- meise (<i>Parus ater</i>)	Tannen- meise (<i>Parus ater</i>)	B4 (4)	A2 / C11a (≥1)	A2 (3)	C11a (4-5)	Höhlen- brüter, Annahme [Link]	* (8.000- 15.000)	Nein	
	Trauer- schnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	Trauer- schnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	Trauer- schnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	Trauer- schnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	B9 / C11a (1)	C11a (1)	C11a (1)	C11a (1-2)	Höhlen- brüter, Annahme [Link]	3 (500-1.500)	Nein	

	Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	Nahrungsgast	Nahrungsgast	Nahrungsgast	Nahrungsgast	(brütet meist in hohen Gebäuden wie Kirchtürmen [Link] , spezielle Nisthilfen erhältlich [Link])	* (700-1.000)	Ja
	Turteltaube (<i>Streptopelia turtur</i>)		Waldbaumläufer (<i>Certhia familiaris</i>)		A2 (1)		A2 (1)		(brütet frei in Bäumen und Hecken [Link])	2 (150-300)	Nein
	Wacholderdrossel (<i>Turdus pilaris</i>)	Wacholderdrossel (<i>Turdus pilaris</i>)			Gastvogel	Gastvogel			(brütet frei in Bäumen [Link])	V (1.000-3.000)	Nein
	Waldbaumläufer (<i>Certhia familiaris</i>)	Waldbaumläufer (<i>Certhia familiaris</i>)			A2 (1)	A2 (1)			Nest hinter loser Rinde/in Baumspalten [Link] , spezielle Nisthilfen [Link]	* (2.000-4.000)	Nein
	Waldlaubsänger (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)	Waldlaubsänger (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)			A2 (1)	A2 (1)			(brütet meist in Vertiefungen auf Laub am Boden [Link])	* (1.000-3.000)	Nein

	Weiden- meise (<i>Poecile montanus</i>)	Weiden- meise (<i>Poecile montanus</i>)			außerhalb der Brutzeit	außerhalb der Brutzeit			Höhlen- brüter, potenziell, aber zimmert sich meistens ihre eigenen Höhlen (Link)	* (2.000- 6.000)	Nein
			Wendehals (<i>Jynx torquilla</i>)				A2 (1)		potenziell, in Baum- höhlen und Nistkästen (Link)	2 (50-100)	Ja
		Wespen- bussard (<i>Pernis apivorus</i>)		Wespen- bussard (<i>Pernis apivorus</i>)		A1		A1	(Horst hoch in Bäumen (Link))	* (50-100)	Ja
	Wintergold- hähnchen (<i>Regulus regulus</i>)	Wintergold- hähnchen (<i>Regulus regulus</i>)	Wintergold- hähnchen (<i>Regulus regulus</i>)	Wintergold- hähnchen (<i>Regulus regulus</i>)	B4 (3)	A2 (1-2)	A2 (1)	B4 (1-2)	(Kugelnest in Nadel- bäumen (Link))	* (10.000- 20.000)	Nein
	Zaunkönig (<i>Troglo- dytes troglodytes</i>)	Zaunkönig (<i>Troglo- dytes troglodytes</i>)	Zaunkönig (<i>Troglo- dytes troglodytes</i>)	Zaunkönig (<i>Troglo- dytes troglodytes</i>)	B4 (2)	B4 (3)	B4 (3)	B4 (5-6)	(verstecktes Kugelnest (Link), spezielle Nisthilfen erhältlich (Link))	* (25.000- 50.000)	Nein
	Zilpzalp (<i>Phyllo- scopus collybita</i>)	Zilpzalp (<i>Phyllo- scopus collybita</i>)	Zilpzalp (<i>Phyllo- scopus collybita</i>)	Zilpzalp (<i>Phyllo- scopus collybita</i>)	A2 (1)	B4 (3)	B4 (3)	B4 (5-6)	(Kugelnest in Boden- vegetation (Link))	* (30.000- 70.000)	Nein

Eppelborn (ILL/Klingel- floß)	Insgesamt 45 Arten (38 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 52 Arten (40 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 54 Arten (43 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 47 Arten (43 mögliche bis sichere Brutvögel)							
Begehungen: N = 6 (4 während Brutzeit)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	B3 (3)	C11a, C12 (≥5)	B4 (3-4)	B4 (≥5)	Freibrüter, Halb- höhlen- kästen, <u>Annahme</u> (Link)	* (80.000- 120.000)	Nein
26.03.2024, 26.04.2024, 03.06.2024, 18.07.2024, (28.09.2024), (26.11.2024)	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	B4 (3)	C11a, C13a (≥6)	C11a, B4-6 (≥3)	C11a (≥2)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> (Link)	* (40.000- 60.000)	Nein
	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	B4 (2)	B3 (≥4)	B4 (2-3)	B4 (≥3)	(Freibrüter auf Bäumen/in Hecken (Link))	* (50.000- 70.000)	Nein
	Buntspecht (<i>Dendro- copos major</i>)	Buntspecht (<i>Dendro- copos major</i>)	Buntspecht (<i>Dendro- copos major</i>)	Buntspecht (<i>Dendro- copos major</i>)	B3 (1)	A1	A2 (2)	A2 (≥2)	(eigene Specht- höhlen (Link))	* (4.000- 8.000)	Nein
	Dohle (<i>Coloeus monedula</i>)	Dohle (<i>Coloeus monedula</i>)			Gastvogel	Gastvogel			Höhlen- brüter, potenziell (Link), aber auch spezielle Nistkästen erhältlich (Link)	* (1.500- 3.000)	Nein

	Dorngras- mücke (<i>Sylvia communis</i>)	Dorngras- mücke (<i>Sylvia communis</i>)	Dorngras- mücke (<i>Sylvia communis</i>)		B4 (4-5)	B4 (3)	B4 (3)		(Hecken- brüter [Link])	* (10.000- 18.000)	Nein
		Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)		A1	A1	A1	(Freibrüter, meist hoch in Bäumen [Link])	* (3.500- 7.000)	Nein
	Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)		Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)	Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)	A1		A1	Nahrungs- gast	(Brut- höhlen in Steilufern [Link] , potenziell auch im Gebiet möglich)	* (100-200)	Ja
	Elster (<i>Pica pica</i>)	Elster (<i>Pica pica</i>)	Elster (<i>Pica pica</i>)	Elster (<i>Pica pica</i>)	A1	A1	A1	A1	(Freibrüter in Bäumen [Link])	* (5.000- 8.000)	Nein
	Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	(Freibrüter in Nadel- bäumen [Link])	* (10-100)	Nein
		Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)			A2 (1-2)	A2 (1)	A2 (1)	(brütet meist am Boden [Link])	* (6.000- 10.000)	Nein
	Garten- baum- läufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)	Garten- baum- läufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)	Garten- baum- läufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)	Garten- baum- läufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)	A1	A2 (1-2)	A2 (1)	B4 (1-2)	Nest hinter loser Rinde/in Baum- spalten [Link] , spezielle Nisthilfen [Link])	* (5.000- 10.000)	Nein

	Garten- grasmücke (<i>Sylvia borin</i>)	Garten- grasmücke (<i>Sylvia borin</i>)	Garten- grasmücke (<i>Sylvia borin</i>)	Garten- grasmücke (<i>Sylvia borin</i>)	B4 (2)	B4 (1-2)	A2 (1)	A2 (1)	(Hecken- brüter [Link])	* (10.000- 17.000)	Nein
			Gartenrot- schwanz (<i>Phoeni- curus phoeni- curus</i>)	Gartenrot- schwanz (<i>Phoeni- curus phoeni- curus</i>)			B4 (1-2)	A2 (1)	Höhlen- und Halb- höhlen- brüter, potenziell [Link]	* (2.000- 5.000)	Nein
	Gebirgs- stelze (<i>Motacilla cinerea</i>)	Gebirgs- stelze (<i>Motacilla cinerea</i>)	Gebirgs- stelze (<i>Motacilla cinerea</i>)	Gebirgs- stelze (<i>Motacilla cinerea</i>)	A1	B3 (1)	A1	C11a (1)	(brütet frei in Ufernähe, <u>Annahme</u> [Link])	* (500-1.500)	Nein
	Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	B3 (1)	A1	B3 (1)	A1	(Freibrüter, meist in Nadel- bäumen [Link])	* (2.000- 7.000)	Nein
				Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)				B3 (1)	(Boden- brüter in dichter Vegetation oder niedrig in Hecken [Link])	* (10.000- 20.000)	Nein
	Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	Nahrungs- gast	Nahrungs- gast	Nahrungs- gast	Nahrungs- gast	(Kolonie- brüter in alten Bäumen [Link])	* (200-250)	Nein
			Grau- schnäpper (<i>Muscicapa striata</i>)				C11a (1)		Freibrüter, Halbhöhlen kasten,	* 1.000-2.000	Nein

									<u>Annahme</u> (Link)				
	Grauspecht <i>(Picus canus)</i>				A2 (1)					(Bau eigener oder Adaption bestehender Spechthöhlen (Link))	1 (30-80)	Ja	
	Grünfink <i>(Carduelis chloris)</i>	Grünfink <i>(Carduelis chloris)</i>		Grünfink <i>(Carduelis chloris)</i>	Grünfink <i>(Carduelis chloris)</i>	A1		A2 (1)	B4 (1)	A1	(Freibrüter, meist in Hecken (Link))	* (10.000-15.000)	Nein
	Grünspecht <i>(Picus viridis)</i>	Grünspecht <i>(Picus viridis)</i>		Grünspecht <i>(Picus viridis)</i>	Grünspecht <i>(Picus viridis)</i>	B4 (1-2)		B4 (1-2)	B4 (2)	B4 (1-2)	(Brut meist in verlassenen Spechthöhlen (Link))	* (1.000-2.000)	Ja
		Hausrotschwanz <i>(Phoenicurus ochruros)</i>		Hausrotschwanz <i>(Phoenicurus ochruros)</i>	Hausrotschwanz <i>(Phoenicurus ochruros)</i>			Nahrungsgast (Bruten unter Dächern)	Nahrungsgast (Bruten unter Dächern)	Nahrungsgast (Bruten unter Dächern)	(brütet an Gebäuden (Link))	* 10.000-20.000	Nein
	Haus-sperling <i>(Passer domesticus)</i>	Haus-sperling <i>(Passer domesticus)</i>		Haus-sperling <i>(Passer domesticus)</i>	Haus-sperling <i>(Passer domesticus)</i>	A1		A1 (Bruten unter Dächern)	A1 (Bruten unter Dächern)	C11a (1)	meist Höhlenbrüter, Annahme (Link)	V (30.000-60.000)	Nein
	Heckenbraunelle <i>(Prunella modularis)</i>	Heckenbraunelle <i>(Prunella modularis)</i>		Heckenbraunelle <i>(Prunella modularis)</i>	Heckenbraunelle <i>(Prunella modularis)</i>	B4 (1-2)		A2 (1)	B4 (1-2)	B4 (1-2)	(meist Heckenbrüter (Link))	* 15.000-30.000)	Nein

			Jagdfasan (<i>Phasianus colchicus</i>)				A2 (1)		(Boden- brüter [Link])	Etabliertes Neozoon (1.000- 3.000)	Nein
				Hohltaube (<i>Columba oenas</i>)				A2 (1)	Höhlen- brüter, z.B. in verlassenen Specht- höhlen (Link) , spezielle bzw. Waldkauz- nistkästen (Link)	* (400-800)	Nein
	Kanadagans (<i>Branta canadensis</i>)	Kanadagans (<i>Branta canadensis</i>)	Kanadagans (<i>Branta canadensis</i>)	Kanadagans (<i>Branta canadensis</i>)	Nahrungs- gast	A1	B3 (1)	A1	(Boden- brüter [Link] , potenziell am Fisch- weiher)	Etabliertes Neozoon (40-60)	Nein
		Kernbeißer (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	Kernbeißer (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)			A2 (1)	A2 (2)		(brütet frei, meist hoch in Laub- bäumen [Link])	* (1.000- 3.000)	Nein
		Klapper- grasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)		Klapper- grasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)		A2 (1)		B4 (1-2)	(Hecken- brüter [Link])	* (2.000- 6.000)	Nein
	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	C11a	B4 (3)	B9 (≥4)	B4 (1)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> (Link)	* (10.000- 20.000)	Nein

	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	B4 (5)	C11a, C13a (≥6)	C11a, C16 (≥10)	C11a (≥6)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> (Link)	* (60.000- 100.000)	Nein
	Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	Nahrungs- gast	Nahrungs- gast	Nahrungs- gast	Nahrungs- gast	(Kolonie- brüter, meist auf hohen Bäumen (Link))	im Saarland nur 1 Kolonie an Blies	Nicht mehr
			Kuckuck (<i>Cuculus canorus</i>)				A2 (1)		(Brut- parasit (Link))	2 (100-300)	Nein
		Mauer- segler (<i>Apus apus</i>)	Mauer- segler (<i>Apus apus</i>)	Mauer- segler (<i>Apus apus</i>)		Nahrungs- gast	Nahrungs- gast	Nahrungs- gast (Bruten unter Dächern)	(brütet an Gebäuden (Link))	* 2.000-7.000	Nein
	Mäuse- bussard (<i>Buteo buteo</i>)	Mäuse- bussard (<i>Buteo buteo</i>)	Mäuse- bussard (<i>Buteo buteo</i>)	Mäuse- bussard (<i>Buteo buteo</i>)	A1	A1	C12 (1)	C12 (1)	(Horst hoch in Bäumen (Link))	* (800-1.600)	Ja
		Mehl- schwalbe (<i>Delichon urbicum</i>)		Mehl- schwalbe (<i>Delichon urbicum</i>)		Nahrungs- gast		Nahrungs- gast	(Lehm- nester meist an Gebäuden (Link), spezielle Nisthilfen erhältlich (Link))	3 (6.000- 12.000)	Nein
	Mistel- drossel (<i>Turdus viscivorus</i>)			Mistel- drossel (<i>Turdus viscivorus</i>)	A2 (1)			A2 (1)	(brütet frei, meist in Nadel- bäumen (Link))	* 1.000- 3.000)	Nein

		Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>)	Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>)	Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>)		A2 (1)	außerhalb der Brutzeit	A2 (1)	(eigene Spechthöhlen [Link])	* (1.000- 1.500)	Ja
	Mönchs- grasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Mönchs- grasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Mönchs- grasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Mönchs- grasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	B4 (3-4)	B4 (≥5)	B4 (8)	B4 (≥9)	(Hecken- brüter [Link])	* (30.000- 70.000)	Nein
				Nachtigall (<i>Luscinia megarhynchos</i>)				B4 (1)	(Hecken- brüter [Link])	* (1.000- 2.000)	Nein
	Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)	Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)	Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)	Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)	A1	B9 (1)	A1 (Brut oberhalb Fröschengarten)	C11a (2-3)	(Freibrüter, hoch in Bäumen [Link])	* (5.000- 10.000)	Nein
		Rauch- schwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)	Rauch- schwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)			Nahrungs- gast	Nahrungs- gast		(Nester meist in Stallungen [Link])	3 (3.000- 6.000)	Nein
	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	B4 (2)	B4 (≥3)	C13a, B4 (≥4)	B4 (6)	(brütet frei, meist in Bäumen [Link])	* (15.000- 25.000)	Nein
	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	B4 (2)	B4 (≥3)	B4, C12 (3-4)	B4 (≥5)	Freibrüter, potenziell in Halbhöhlen- kästen [Link])	* (40.000- 60.000)	Nein
	Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)	Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)			Nahrungs- gast	Nahrungs- gast			(Horst meist in alten	* (80-100)	Ja

			Schwarz- specht (<i>Dryocopus martius</i>)				außerhalb der Brutzeit		Bäumen [Link])				
		Schwanz- meise (<i>Aegithalos caudatus</i>)		Schwanz- meise (<i>Aegithalos caudatus</i>)		Gastvogel		B3 (1)	(Kugelnest in Bäumen oder Hecken [Link])	* (2.000- 4.000)	Nein		
	Schwarz- specht (<i>Dryocopus martius</i>)			Schwarz- specht (<i>Dryocopus martius</i>)	A1			A1	(eigene Specht- höhlen [Link])	* (250-500)	Ja		
	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)		Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	A2 (1)	A2 (1-2)		B4 (2-3)	(brütet frei, meist in Nadel- bäumen [Link])	* (10.000- 20.000)	Nein		
	Sommer- gold- hähnchen (<i>Regulus ignicapillus</i>)			Sommer- gold- hähnchen (<i>Regulus ignicapillus</i>)	A2 (2)			A2 (1)	(Kugelnest, meist in Bäumen [Link])	* (10.000- 20.000)	Nein		
	Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)	Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)		Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)		A1		A1		* (300-500)	Ja		
	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)		Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	A1 /C11a		C11a, C13a (≥3)	C11a (≥2)	Höhlen- brüter, Annahme [Link]	* (25.000- 40.000)	Nein	
	Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)			Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)	Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)	B4 (1-2)			A2 (1)	B4 (1)	(Freibrüter in Gehölzen [Link])	* (2.000- 5.000)	Nein
	Stockente (<i>Anas platy- rhynchos</i>)	Stockente (<i>Anas platy- rhynchos</i>)		Stockente (<i>Anas platy- rhynchos</i>)	Stockente (<i>Anas platy- rhynchos</i>)	B3 (2-3)		B3 (3)	C12 (2)	C12 (≥2)	(Boden- brüter [Link])	* (2.000- 4.000)	Nein

		Straßen- taube (<i>Columba livia f. domestica</i>)	Straßen- taube (<i>Columba livia f. domestica</i>)			Nahrungs- gast	Nahrungs- gast		(brütet an Gebäuden [Link])	Etabliertes Neozoon (5.000-10.000)	Nein
	Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)	Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)	Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)	Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)	B4 (1)	A2 (1)	A2 (3-4)	B4 (1)	Höhlen- brüter, potenziell [Link]	* (5.000-15.000)	Nein
	Sumpfrohr- sänger (<i>Acrocephalus palustris</i>)	Sumpfrohr- sänger (<i>Acrocephalus palustris</i>)	Sumpfrohr- sänger (<i>Acrocephalus palustris</i>)		B4 (3-4)	B4 (2)	A2 (1)		(Freibrüter in Dickicht, oft Brennesseln [Link])	V (2.000-4.000)	Nein
		Tannen- meise (<i>Parus ater</i>)	Tannen- meise (<i>Parus ater</i>)			A2 (1)	außerhalb der Brutzeit		Höhlen- brüter, potenziell [Link]	* (8.000-15.000)	Nein
	Trauer- schnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)		Trauer- schnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)		A2 (1)		C11a (1)		Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> [Link]	3 (500-1.500)	Nein
	Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)		Nahrungs- gast	Nahrungs- gast	Nahrungs- gast (Baumbrut oberhalb Fröschen- garten!)		(brütet meist in hohen Gebäuden wie Kirch- türmen [Link] , spezielle Nisthilfen erhältlich [Link])	* (700-1.000)	Ja
	Wacholder- drossel	Wacholder- drossel			A1	A1			(brütet frei in Bäumen [Link])	V (1.000-3.000)	Nein

Urexweiler (Rübendell- bach)	Insgesamt 30 Arten (26 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 35 Arten (26 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 31 Arten (27 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 36 Arten (33 mögliche bis sichere Brutvögel)							
Begehungen: N = 4 (3 während der Brutzeit)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	B3 (2)	B4 (≥1)	A2 (1)	B4 (≥4)	Freibrüter, potenziell in Halb- höhlen- kästen (Link)	* (80.000- 120.000)	Nein
26.02.2024, 23.04.2024, 23.05.2024, (20.11.2024)			Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)	Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)			A1	A1	Freibrüter, potenziell in Halb- höhlen- kästen (Link)	* (3.000- 6.000)	Nein
	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	B4 / C11a (3)	C11a, C13a (≥2)	A2 (≥1)	C11a (≥5)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> (Link)	* (40.000- 60.000)	Nein
	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	B4 (2-3)	A2 (≥1)	A2 (2)	B4 (≥3)	(Freibrüter auf Bäumen/in Hecken (Link))	* (50.000- 70.000)	Nein
	Buntspecht (<i>Dendro- copos major</i>)	Buntspecht (<i>Dendro- copos major</i>)	Buntspecht (<i>Dendro- copos major</i>)	Buntspecht (<i>Dendro- copos major</i>)	außerhalb der Brutzeit	B4 (1-2)	A2 (1)	A2 (1)	(eigene Specht- höhlen (Link))	* (4.000- 8.000)	Nein
		Dorngras- mücke (<i>Sylvia communis</i>)	Dorn- grasmücke (<i>Sylvia communis</i>)	Dorngras- mücke (<i>Sylvia communis</i>)		A2 (2)	A2 (1)	B4 (1)	(Hecken- brüter (Link))	* (10.000- 18.000)	Nein

	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	A1	A1	A1	A1	(Freibrüter, meist hoch in Bäumen [Link])	* (3.500- 7.000)	Nein
	Elster (<i>Pica pica</i>)	Elster (<i>Pica pica</i>)	Elster (<i>Pica pica</i>)	Elster (<i>Pica pica</i>)	außerhalb der Brutzeit	A1	A1	B9 (1)	(Freibrüter in Bäumen [Link])	* (5.000- 8.000)	Nein
		Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)		Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	(Freibrüter in Nadel- bäumen [Link])	* (10-100)	Nein
	Garten- baum- läufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)	Garten- baum- läufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)	Garten- baum- läufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)		A2 (2)	A2 (1)	A2 (1)		Nest hinter loser Rinde/in Baum- spalten [Link] , spezielle Nisthilfen [Link]	* (5.000- 10.000)	Nein
				Garten- grasmücke (<i>Sylvia borin</i>)				B4 (1)	(Hecken- brüter [Link])	* (10.000- 17.000)	Nein
	Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)				A1				(Freibrüter, meist in Nadel- bäumen [Link])	* (2.000- 7.000)	Nein
		Gartenrot- schwanz (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)				A2 (1)			Höhlen- und Halb- höhlen- brüter, potenziell [Link]	* (2.000- 5.000)	Nein

	Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)	Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)	Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)	Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)	A2 (1)	B4 (1-2)	B4 (1)	B4 (2)	(Boden- brüter in dichter Vegetation oder niedrig in Hecken [Link])	* (10.000- 20.000)	Nein
		Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)		Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)		Nahrungs- gast		Nahrungs- gast	(Kolonie- brüter in alten Bäumen [Link])	* (200-250)	Nein
	Grünfink (<i>Carduelis chloris</i>)				A2 (1)				(Freibrüter, meist in Hecken [Link])	* (10.000- 15.000)	Nein
	Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	B4 (1)	B4 (1)	A2 (1)	B4 (2)	(Brut meist in verlassenen Specht- höhlen [Link])	* (1.000- 2.000)	Ja
	Hecken- braunelle (<i>Prunella modularis</i>)		Hecken- braunelle (<i>Prunella modularis</i>)		A2 (1)		A2 (1)		(meist Hecken- brüter [Link])	* 15.000- 30.000)	Nein
	Hohltaube (<i>Columba oenas</i>)	Hohltaube (<i>Columba oenas</i>)	Hohltaube (<i>Columba oenas</i>)	Hohltaube (<i>Columba oenas</i>)	B4 (1)	B4 (1)	B4 (1)	B4 (1-2)	Höhlen- brüter, z.B. in verlassenen Specht- höhlen [Link] , spezielle bzw. Waldkauz-	* (400-800)	Nein

			Jagdfasan (<i>Phasianus colchicus</i>)				B4 1		nistkästen (Link)		
									(Boden- brüter (Link))	Etabliertes Neozoon (1.000- 3.000)	Nein
		Kernbeißer (<i>Cocco- thraustes cocco- thraustes</i>)		Kernbeißer (<i>Cocco- thraustes cocco- thraustes</i>)		A2 (2)		B4 (1-2)	(brütet frei, meist hoch in Laub- bäumen (Link))	* (1.000- 3.000)	Nein
				Klapper- grasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)				A2 (1)	(Hecken- brüter (Link))	* (2.000- 6.000)	Nein
	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	B4 (1)	A2 (1)	C11a (1)	A2 (1)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> (Link)	* (10.000- 20.000)	Nein
		Kleinspecht (<i>Dendro- copos minor</i>)				außerhalb der Brutzeit			(eigene Specht- höhlen in morschen Bäumen (Link))	V (250-500)	Nein
	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	B4 / C11a (3-4)	B4 / C11a (3-4)	B4 (≥2)	B4, B7 (≥3)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> (Link)	* (60.000- 100.000)	Nein
		Mauer- segler (<i>Apus apus</i>)				Nahrungs- gast			(brütet an Gebäuden (Link))	* 2.000-7.000	Nein
	Mäuse- bussard (<i>Buteo buteo</i>)	Mäuse- bussard (<i>Buteo buteo</i>)	Mäuse- bussard (<i>Buteo buteo</i>)	Mäuse- bussard (<i>Buteo buteo</i>)	B5 (1-2)	A1	A1	B5 (1)	(Horst hoch in Bäumen (Link))	* (800-1.600)	Ja

		Mistel- drossel (<i>Turdus viscivorus</i>)	Mistel- drossel (<i>Turdus viscivorus</i>)	Mistel- drossel (<i>Turdus viscivorus</i>)		Gastvogel	A2 (1)	B4 (1-2)	(brütet frei, meist in Nadel- bäumen [Link])	* 1.000- 3.000)	Nein
	Mittel- specht (<i>Dendro- copos medius</i>)	Mittel- specht (<i>Dendro- copos medius</i>)	Mittel- specht (<i>Dendro- copos medius</i>)	Mittel- specht (<i>Dendro- copos medius</i>)	A2 (1)	außerhalb der Brutzeit	A2 (1)	A2 (1)	(eigene Specht- höhlen [Link])	* (1.000- 1.500)	Ja
	Mönchs- grasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Mönchs- grasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)		Mönchs- grasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	A2 (1)	A2 (1)		B4 (≥4)	(Hecken- brüter [Link])	* (30.000- 70.000)	Nein
		Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)		Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)		A1		A1	(Hecken- brüter [Link])	* (1.000- 2.000)	Ja
	Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)	Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)	Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)	Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)	A1	A1	A1	C11a (≥1)	(Freibrüter, hoch in Bäumen [Link])	* (5.000- 10.000)	Nein
	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	B4 (1-2)	B4 (1-2)	B4 (1)	B4 (≥2)	(brütet frei, meist in Bäumen [Link])	* (15.000- 25.000)	Nein
			Rotdrossel (<i>Turdus iliacus</i>)				Gastvogel		(brütet frei in Napfnester [Link])	im Saarland kein Brutvogel	Nein
	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	B4 / C11a (2-3)	B4 (2-3)	A2 (1)	B4 (3)	Freibrüter, Halb- höhlen- kästen, <u>Annahme</u> [Link])	* (40.000- 60.000)	Nein

	Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)			Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)	Nahrungsgast			A1	(Horst meist in alten Bäumen [Link])	* (80-100)	Ja
		Schwanzmeise (<i>Aegithalos caudatus</i>)				Gastvogel			(Kugelnest in Bäumen oder Hecken [Link])	* (2.000-4.000)	Nein
		Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>)		Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>)		B4 (1)		A2 (1)	(eigene Spechthöhlen [Link])	* (250-500)	Ja
	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	B4 (1-2)	B4 (1-2)	B4 (1-2)	B4 (≥2)	(brütet frei, meist in Nadelbäumen [Link])	* (10.000-20.000)	Nein
				Sommergoldhähnchen (<i>Regulus ignicapillus</i>)			A2 (1)	A2 (1)	(Kugelnest, meist in Bäumen [Link])	* (10.000-20.000)	Nein
	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	A2 (1-2)	A2 (1-2)	A2 (1-2)	B4 (≥5)	Höhlenbrüter, potenziell [Link]	* (25.000-40.000)	Nein
				Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)				A1	(Freibrüter in Gehölzen [Link])	* (2.000-5.000)	Nein
	Sumpfmeise (<i>Parus palustris</i>)		Sumpfmeise (<i>Parus palustris</i>)	Sumpfmeise (<i>Parus palustris</i>)	A2 (1)		A2 (1)	C11a (1)	Höhlenbrüter, Annahme [Link]	* (5.000-15.000)	Nein

	Tannen- meise (<i>Parus ater</i>)	Tannen- meise (<i>Parus ater</i>)			B4 (1)	A2 (1)			Höhlen- brüter, potenziell (Link)	* (8.000- 15.000)	Nein
		Turmfalke (<i>Falco tinnun- culus</i>)	Turmfalke (<i>Falco tinnun- culus</i>)	Turmfalke (<i>Falco tinnun- culus</i>)		Nahrungs- gast	Nahrungs- gast	Nahrungs- gast	(brütet meist in hohen Gebäuden wie Kirch- türmen (Link), spezielle Nisthilfen erhältlich (Link))	* (700-1.000)	Ja
	Wacholder- drossel (<i>Turdus pilaris</i>)		Wacholder- drossel (<i>Turdus pilaris</i>)		Gastvogel		A1		(brütet frei in Bäumen (Link))	V (1.000- 3.000)	Nein
		Wiesen- pieper (<i>Anthus pratensis</i>)				Rastvogel			(Boden- brüter (Link))	1 (10-20)	Nein
	Weiden- meise (<i>Poecile montanus</i>)		Weiden- meise (<i>Poecile montanus</i>)		A2 (1)		außerhalb der Brutzeit		Höhlen- brüter, potenziell, aber zimmert sich meistens ihre eigenen Höhlen (Link)	* (2.000- 6.000)	Nein

	Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)		Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	A2 (1)	A2 (2)		B4 (1-2)	(verstecktes Kugelnest [Link] , spezielle Nisthilfen erhältlich [Link])	* (25.000-50.000)	Nein
	Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	A2 (2)	B4 (2)	B4 (1-2)	B4 (≥3)	(Kugelnest in Bodenvegetation [Link])	* (30.000-70.000)	Nein
zwischen Berschweiler und Urexweiler (Frankenbach)			Insgesamt 19 Arten (17 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 21 Arten (21 mögliche bis sichere Brutvögel)							
Begehungen: N = 3 (2 während der Brutzeit)			Amsel (<i>Turdus merula</i>)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)			A1	B4 (2-3)	Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen [Link]	* (80.000-120.000)	Nein
17.03.2024, 03.06.2024, (15.11.2024)			Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)			A2 (≥1)	B7 (≥2)	Höhlenbrüter, <u>Annahme</u> [Link]	* (40.000-60.000)	Nein
			Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)			A2 (7)	B4 (5)	(Freibrüter auf Bäumen/in Hecken [Link])	* (50.000-70.000)	Nein

			Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>) Garten- baum- läufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)	Buntspecht (<i>Dendrocopos major</i>)			Gastvogel A2 (1)	A2 (3)	(eigene Specht- höhlen [Link])	* (4.000- 8.000)	Nein
									(Freibrüter in Nadelbäum en [Link])	* (10-100)	Nein
				Garten- baum- läufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)				A2 (1)	Nest hinter loser Rinde/in Baum- spalten (Link), spezielle Nisthilfen (Link)	* (5.000- 10.000)	Nein
				Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)				A2 (1)	(Brut meist in verlassenen Specht- höhlen [Link])	* (1.000- 2.000)	Ja
				Hohltaube (<i>Columba oenas</i>)				A2 (3)	Höhlen- brüter, z.B. in verlassenen Specht- höhlen (Link), spezielle bzw. Waldkauz- nistkästen (Link)	* (400-800)	Nein

				Kernbeißer (<i>Cocco-thraustes cocco-thraustes</i>)				A2 (1)	(brütet frei, meist hoch in Laub- bäumen [Link])	* (1.000- 3.000)	Nein
			Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)			A2 (5)	C11a (1)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> (Link)	* (10.000- 20.000)	Nein
			Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)			B4 / C11a (4)	C11a (≥5)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> (Link)	* (60.000- 100.000)	Nein
			Mäuse- bussard (<i>Buteo buteo</i>)				A1	A1	(Horst hoch in Bäumen [Link])	* (800-1.600)	Ja
			Mistel- drossel (<i>Turdus viscivorus</i>)	Mistel- drossel (<i>Turdus viscivorus</i>)			A2 (2)	B4 (1-2)	(brütet frei, meist in Nadel- bäumen [Link])	* 1.000- 3.000)	Nein
				Mönchs- grasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)				B4 (3-4)	(Hecken- brüter [Link])	* (30.000- 70.000)	Nein
				Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)				A2 (4)	(brütet frei, meist in Bäumen [Link])	* (15.000- 25.000)	Nein
			Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)			A2 (3)	B4 (≥3)	Freibrüter, potenziell, in Halb- höhlen- kästen (Link))	* (40.000- 60.000)	Nein

			Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)			A2 (1)	A2 (2)	(brütet frei, meist in Nadel- bäumen [Link])	* (10.000- 20.000)	Nein
			Sommer- gold- hähnchen (<i>Regulus ignicapillus</i>)	Sommer- gold- hähnchen (<i>Regulus ignicapillus</i>)			A2 (2)	A2 (2)	(Kugelnest, meist in Bäumen [Link])	* (10.000- 20.000)	Nein
			Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)				A1		(Horst meist in Nadel- bäumen [Link])	* (300-500)	Ja
			Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)	Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)			A2 (4)	A2 (1)	Höhlen- brüter, potenziell [Link]	* (5.000- 15.000)	Nein
			Tannen- meise (<i>Parus ater</i>)	Tannen- meise (<i>Parus ater</i>)			A2 (2-3)	B4 (2)	Höhlen- brüter, potenziell [Link]	* (8.000- 15.000)	Nein
			Trauer- schnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	Trauer- schnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)			C11a (1)	C11a (1-2)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> [Link]	3 (500-1.500)	Nein
			Wintergold- hähnchen (<i>Regulus regulus</i>)				außerhalb der Brutzeit		(Kugelnest in Nadel- bäumen [Link])	* (10.000- 20.000)	Nein
			Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)			A2 (3)	A2 (4)	(verstecktes Kugelnest [Link] , spezielle Nisthilfen	* (25.000- 50.000)	Nein

							A2 (3)		erhältlich [Link])		
			Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)				B4 (4-5)	(Kugelnest in Boden- vegetation [Link])	* (30.000- 70.000)	Nein
							A2 (3-4)				
zwischen Urexweiler und Hirzweiler (ILL)			Insgesamt 41 Arten (32 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 46 Arten (36 mögliche bis sichere Brutvögel)							
Begehungen: N = 4 (3 während der Brutzeit)			Amsel (<i>Turdus merula</i>)	Amsel (<i>Turdus merula</i>)			A1	B4 (3-4)	Freibrüter, potenziell in Halb- höhlen- kästen [Link]	* (80.000- 120.000)	Nein
15.03.2024, 23.04.2024, 23.05.2024, (04.12.2024)			Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)	Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)				C14b (1)	Freibrüter, potenziell in Halb- höhlen- kästen [Link]	* (3.000- 6.000)	Nein
				Baum- pieper (<i>Anthus trivialis</i>)			C11a /C13a (≥3)	A2 (1)	(Freibrüter auf Bäumen/in Hecken [Link])	V (1.000- 3.000)	Nein
			Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)				C11a/ C13a/C14b (≥4)	Höhlen- brüter, Annahme [Link]	* (40.000- 60.000)	Nein

				Blut- hänfling (<i>Linaria cannabina</i>)				B4 (1)	(brütet in Hecken/auf Bäumen, oft in Nadel- bäumen [Link])	V (2.000- 5.000)	Nein
			Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)			A2 (3-4)	B4 (6-7)	(Freibrüter auf Bäumen/in Hecken [Link])	* (50.000- 70.000)	Nein
			Buntspecht (<i>Dendro- copos major</i>)	Buntspecht (<i>Dendro- copos major</i>)			A2 (1)	A1	(eigene Specht- höhlen [Link])	* (4.000- 8.000)	Nein
			Dohle (<i>Coloeus monedula</i>)	Dohle (<i>Coloeus monedula</i>)			Gastvogel	Gastvogel	Höhlen- brüter, potenziell [Link] , aber auch spezielle Nistkästen erhältlich [Link]	* (1.500- 3.000)	Nein
			Dorn- grasmücke (<i>Sylvia communis</i>)	Dorn- grasmücke (<i>Sylvia communis</i>)			A2 (1)	B4 (1-2)	(Hecken- brüter [Link])	* (10.000- 18.000)	Nein
			Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)			A1	A1	(Freibrüter, meist hoch in Bäumen [Link])	* (3.500- 7.000)	Nein
			Elster (<i>Pica pica</i>)	Elster (<i>Pica pica</i>)			B9 (1)	C11a (≥1)	(Freibrüter in Bäumen [Link])	* (5.000- 8.000)	Nein

			Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)				Gastvogel		(Freibrüter in Nadel- bäumen [Link])	* (10-100)	Nein
				Feldlerche (<i>Alauda arvensis</i>)				A2 (3)	(Boden- brüter [Link])	V (6.000- 12.000)	Nein
			Feld- sperling (<i>Passer montanus</i>)	Feld- sperling (<i>Passer montanus</i>)			B6 (1)	B3 (1)	Höhlen- brüter, potenziell [Link]	V (2.000- 5.000)	Nein
			Garten- grasmücke (<i>Sylvia borin</i>)				A2 (2)		(Hecken- brüter [Link])	* (10.000- 17.000)	Nein
				Garten- baum- läufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)				A2 (2)	Nest hinter loser Rinde/in Baum- spalten [Link] , spezielle Nisthilfen [Link]	* (5.000- 10.000)	Nein
				Gartenrot- schwanz (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)				B4 (1-2)	Höhlen- und Halb- höhlen- brüter, potenziell [Link]	* (2.000- 5.000)	Nein
				Gebirgs- stelze (<i>Motacilla cinerea</i>)				A1	(brütet frei in Ufernähe [Link])	* (500-1.500)	Nein

			Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)				A1		(Freibrüter, meist in Nadel- bäumen [Link])	* (2.000- 7.000)	Nein
			Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)	Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)			A2 (2)	A2 (2-3)	(Boden- brüter in dichter Vegetation oder niedrig in Hecken [Link])	* (10.000- 20.000)	Nein
			Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)			Nahrungs- gast	Nahrungs- gast	(Kolonie- brüter in alten Bäumen [Link])	* (200-250)	Nein
			Grünfink (<i>Carduelis chloris</i>)				A2 (1)		(Freibrüter, meist in Hecken [Link])	* (10.000- 15.000)	Nein
			Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)				B4 (1-2)		(Brut meist in verlassenen Specht- höhlen [Link])	* (1.000- 2.000)	Ja
			Haus- rotschwanz (<i>Phoenicurus ochruros</i>)				Nahrungs- gast (Bruten unter Dächern)		(brütet an Gebäuden [Link])	* 10.000- 20.000	Nein
			Haus- sperling (<i>Passer domesticus</i>)	Haus- sperling (<i>Passer domesticus</i>)			A1 (Bruten unter Dächern)	B4 (≥3)	meist Höhlen- brüter,	V (30.000- 60.000)	Nein

								potenziell (Link)		
			Hecken- braunelle (<i>Prunella modularis</i>)	Hecken- braunelle (<i>Prunella modularis</i>)			A2 (1)	(meist Hecken- brüter [Link])	* 15.000- 30.000)	Nein
			Jagdfasan (<i>Phasianus colchicus</i>)	Jagdfasan (<i>Phasianus colchicus</i>)			A2 (1)	(Boden- brüter [Link])	Etabliertes Neozoon (1.000- 3.000)	Nein
				Klapper- grasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)			A2 (2)	(Hecken- brüter [Link])	* (2.000- 6.000)	Nein
			Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)			B4 (1)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> (Link)	* (10.000- 20.000)	Nein
			Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)			B7 / C11a (≥3)	Höhlen- brüter, <u>Annahme</u> (Link)	* (60.000- 100.000)	Nein
			Mauer- segler (<i>Apus apus</i>)				Nahrungs- gast	(brütet an Gebäuden [Link])	* 2.000-7.000	Nein
			Mäuse- bussard (<i>Buteo buteo</i>)	Mäuse- bussard (<i>Buteo buteo</i>)			A1	(Horst hoch in Bäumen [Link])	* (800-1.600)	Ja
			Mehl- schwalbe (<i>Delichon urbica</i>)	Mehl- schwalbe (<i>Delichon urbica</i>)			Nahrungs- gast	Gastvogel (jagend und holen sich Lehm für Nester)	3 (6.000- 12.000)	Nein
								(Lehm- nester meist an Gebäuden [Link] , spezielle Nisthilfen		

									erhältlich [Link])		
			Mistel- drossel (<i>Turdus viscivorus</i>)	Mistel- drossel (<i>Turdus viscivorus</i>)			A2 (1)	B4 (1-2)	(brütet frei, meist in Nadel- bäumen [Link])	* 1.000- 3.000)	Nein
			Mönchs- grasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Mönchs- grasmücke			A2 (4)	B4 (≥5)	(Hecken- brüter [Link])	* (30.000- 70.000)	Nein
				Nachtigall (<i>Luscinia mega- rhynchos</i>)				A2 (2)	(Hecken- brüter [Link])	* (1.000- 2.000)	Nein
			Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)	Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)			A1	B9 (≥1)	(Freibrüter, hoch in Bäumen [Link])	* (5.000- 10.000)	Nein
			Rauch- schwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)	Rauch- schwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)			Nahrungs- gast	Nahrungs- gast	(Nester meist in Stallungen [Link])	3 (3.000- 6.000)	Nein
			Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)			B4 (1-2)	B4 (2-3)	(brütet frei, meist in Bäumen [Link])	* (15.000- 25.000)	Nein
			Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)			A2 (5)	B4 (≥2)	Freibrüter, potenziell in Halb- höhlen- kästen [Link])	* (40.000- 60.000)	Nein
			Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)	Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)			Nahrungs- gast	Nahrungs- gast	(Horst meist in alten	* (80-100)	Ja

								Bäumen [Link]		
				Schwarz- milan (<i>Milvus migrans</i>)			Nahrungs- gast	(Horst meist in alten Bäumen [Link])	* (25-50)	Ja
				Schwarz- storch (<i>Ciconia nigra</i>)			Nahrungs- gast	(Horst in hohen alten Bäumen [Link])	* (1-5)	Ja
				Silberreiher (<i>Casmero- dius albus</i>)			Gastvogel	(Kolonien in Schilf- beständen [Link])	im Saarland kein Brutvogel	Ja
			Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)			B4 (2-3)	(brütet frei, meist in Nadel- bäumen [Link])	* (10.000- 20.000)	Nein
			Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)			B4 (≥1)	Höhlen- brüter, potenziell [Link]	* (25.000- 40.000)	Nein
			Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)	Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)			A1	(Freibrüter in Gehölzen [Link])	* (2.000- 5.000)	Nein
			Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)	Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)			A2 (1)	Höhlen- brüter, potenziell [Link]	* (5.000- 15.000)	Nein
				Sumpfrohr- sänger (<i>Acro-</i>			A2 (3)	(Freibrüter in Dickicht, oft Brenn-	V (2.000- 4.000)	Nein

				<i>cephalus palustris</i>)				nesseln [Link])		
			Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)			Nahrungsgast (Brut im Ort)	(brütet meist in hohen Gebäuden wie Kirchtürmen [Link] , spezielle Nisthilfen erhältlich [Link])	* (700-1.000)	Ja
			Wacholderdrossel (<i>Turdus pilaris</i>)				A1	(brütet frei in Bäumen [Link])	V (1.000-3.000)	Nein
				Weißstorch (<i>Ciconia ciconia</i>)			Nahrungsgast	Horste auf Masten etc., aber auch in Bäumen [Link])	* (4-12)	Ja
			Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)			B4 (2-3)	(verstecktes Kugelnest [Link] , spezielle Nisthilfen erhältlich [Link])	* (25.000-50.000)	Nein
			Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)			B4 (2)	(Kugelnest in Bodenvegetation [Link])	* (30.000-70.000)	Nein

Dirmingen, Brühlpark (ILL)				Insgesamt 22 Arten (21 mögliche bis sichere Brutvögel)						
Begehungen: N = 3 (2 während der Brutzeit)				Amsel (<i>Turdus merula</i>)			B4 (1)	Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen (Link)	* (80.000-120.000)	Nein
17.04.2024, 27.05.2024, (27.11.2024)				Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)			A1	Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen (Link)	* (3.000-6.000)	Nein
				Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)			C11a (≥2)	Höhlenbrüter, <u>Annahme</u> (Link)	* (40.000-60.000)	Nein
				Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)			B4 (2)	(Freibrüter auf Bäumen/in Hecken (Link))	* (50.000-70.000)	Nein
				Dohle (<i>Coloeus monedula</i>)			A1	Höhlenbrüter, potenziell (Link), aber auch spezielle Nistkästen	* (1.500-3.000)	Nein

								erhältlich [Link]		
				Elster (<i>Pica pica</i>)			C11a (≥1)	(Freibrüter in Bäumen [Link])	* (5.000- 8.000)	Nein
				Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)			Gastvogel	(Freibrüter in Nadel- bäumen [Link])	* (10-100)	Nein
				Garten- baum- läufer (<i>Certhia brachy- dactyla</i>)			A2 (1)	Nest hinter loser Rinde/in Baum- spalten [Link] , spezielle Nisthilfen [Link]	* (5.000- 10.000)	Nein
				Haus- rotschwanz (<i>Phoeni- curus ochruros</i>)			B3 (1-2)	brütet an Gebäuden, potenziell in Halbhöhlen [Link]	* 10.000- 20.000	Nein
				Haus- sperling (<i>Passer do- mesticus</i>)			B4 (≥1)	meist Höhlen- brüter, potenziell [Link]	V (30.000- 60.000)	Nein
				Kohlmeise (<i>Parus major</i>)			B4 (≥1)	Höhlen- brüter, potenziell [Link]	* (60.000- 100.000)	Nein
				Mauer- segler (<i>Apus apus</i>)			A1	(brütet an Gebäuden [Link])	* 2.000-7.000	Nein

				Mönchs- grasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)				B4 (≥1)	(Hecken- brüter [Link])	* (30.000- 70.000)	Nein
				Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)				A1	(Freibrüter, hoch in Bäumen [Link])	* (5.000- 10.000)	Nein
				Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)				B4 (≥1)	(brütet frei, meist in Bäumen [Link])	* (15.000- 25.000)	Nein
				Rot- kehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)				A2 (≥1)	Freibrüter, potenziell in Halb- höhlen- kästen [Link])	* (40.000- 60.000)	Nein
				Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)				A2 (≥3)	(Freibrüter in Gehölzen [Link])	* (2.000- 5.000)	Nein
				Stockente (<i>Anas platy- rhynchos</i>)				A1	(Boden- brüter [Link])	* (2.000- 4.000)	Nein
				Sumpf- meise (<i>Parus palustris</i>)				A2 (1)	Höhlen- brüter, potenziell [Link])	* (5.000- 15.000)	Nein
				Wacholder- drossel (<i>Turdus pilaris</i>)				C13a (≥1)	(brütet frei in Bäumen [Link])	V (1.000- 3.000)	Nein
				Zaunkönig (<i>Troglo- dytes troglodytes</i>)				B4 (1-2)	(verstecktes Kugelnest [Link]), spezielle	* (25.000- 50.000)	Nein

								Nisthilfen erhältlich [Link])		
				Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)				B4 (2-3) (Kugelnest in Boden- vegetation [Link])	* (30.000- 70.000)	Nein