

**Tab. 1:** Ergebnisse der Brutvogelkartierungen 2025 und Vergleich mit den Ergebnissen aus 2021, 2022, 2023 und 2024 an den Standorten, an denen Nisthilfen ausgebracht wurden.

Nachgewiesene Vogelarten sind alphabetisch nach deutschem Trivialnamen geordnet. Streng geschützte und bestandsgefährdete Arten in Fettschrift.

Der Brutstatus bezieht sich auf die Klassifizierung des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten ([Link](#)). In Klammern die Mindestzahl geschätzter/möglicher Brutpaare im Raum. Die hier vergebenen Brutzeitcodes bedeuten: Mögliches Brüten (A): A1 = Art zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt, A2 = Singendes, trommelndes oder balzendes Männchen zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt; Wahrscheinliches Brüten (B): B3 = Paar zur Brutzeit in geeignetem Bruthabitat festgestellt, B4 = Revierverhalten (Gesang, Kämpfe mit Reviernachbarn etc.) an mind. 2 Tagen im Abstand von mind. 7 Tagen am selben Ort lässt ein dauerhaft besetztes Revier vermuten, B5 = Balzverhalten (Männchen und Weibchen) festgestellt, B6 = Altvogel sucht einen wahrscheinlichen Nestplatz auf, B7 = Warn- oder Angstrufe von Altvögeln oder anderes aufgeregtes Verhalten, das auf ein Nest oder Junge in der näheren Umgebung hindeutet, B9 = Nest- oder Höhlenbau, Anlage einer Nistmulde u.ä. beobachtet; Sicheres Brüten (C): **C11a = benutztes Nest aus der aktuellen Brutperiode gefunden (bei der Säuberung)**, **C11b = Eischalen geschlüpfter Jungvögel aus der aktuellen Brutperiode gefunden (bei der Säuberung)**, C12 = Eben flügge Jungvögel (Nesthocker) oder Dunenjunge (Nestflüchter) festgestellt, C13a = Altvogel verlassen oder suchen einen Nestplatz auf. Das Verhalten der Altvögel deutet auf ein besetztes Nest hin, das jedoch nicht eingesehen werden kann (hoch oder in Höhlen gelegene Nester), C14b = Altvogel mit Futter für die nicht-flüggen Jungen beobachtet, C16 = Junge im Nest gesehen oder gehört

Ob die Nisthilfen von einer Art angenommen wurden, zeigte sich durch Beobachtung bereits vor der Reinigung festgestellt (fütternde Altvögel); „potenziell“ bedeutet, dass die jeweilige Vogelart von den im Raum ausgebrachten Nisthilfen profitieren kann. Mehrere Arten können aufgrund ihrer Brutbiologie nicht mit den ausgebrachten Nisthilfen unterstützt werden.

Rote Liste-Status für das Saarland nach Roth et al. (2020): \* = ungefährdet, V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht. In Klammern von Roth et al. (2020) geschätzte Brutpaare im Saarland.

Streng geschützte Arten sind entweder in dem Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie und/oder der Bundesartenschutzverordnung gelistet.

Standort	Vogelarten 2021	Vogelarten 2022	Vogelarten 2023	Vogelarten 2024	Vogelarten 2025	Brutstatus 2021 (BP)	Brutstatus 2022 (BP)	Brutstatus 2023 (BP)	Brutstatus 2024 (BP)	Brutstaus 2025 (BP)	Nisthilfen am Standort angenommen?	Rote Liste-Status (BP)	Streng geschützte Art?
<b>Alsweiler (Bruchelsbach)</b>	Insgesamt 30 Arten (27 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 29 Arten (26 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 29 Arten (28 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 15 Arten (15 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 29 Arten (28 mögliche bis sichere Brutvögel)	Mind. 36 BP	Mind. 44 BP	Mind. 49 BP	Mind. 29 BP	Mind. 54 BP			
<b>Begehungen:</b> N = 2 (2 während der Brutzeit)	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	A1	B4 (2)	B4 (1)	A1	A2 (4)	Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen ( <a href="#">Link</a> )	* (80.000-120.000)	Nein
14.02.2025, 11.06.2025	Bachstelze ( <i>Motacilla alba</i> )					A1					Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen ( <a href="#">Link</a> )	* (3.000-6.000)	Nein
	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	B7 / C11a / C13a (>3)	A2 / C11a (2)	C11a / C13a (>2)	A2 (1)	C11a / C16 (>3)	Höhlenbrüter, Annahme ( <a href="#">Link</a> )	* (40.000-60.000)	Nein
	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	A2 (1)	A2 (3)	A2 (1)	B3 (3)	A2 (3)	(Freibrüter auf Bäumen/in Hecken ( <a href="#">Link</a> ))	* (50.000-70.000)	Nein
	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )		Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	A1		A2 (1)	A2 (1)	A1	(eigene Spechthöhlen ( <a href="#">Link</a> ))	* (4.000-8.000)	Nein
	Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )	Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )			Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )	A2 (1)	A2 (1)			A2 (1)	(Heckenbrüter ( <a href="#">Link</a> ))	* (10.000-18.000)	Nein
	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )		Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	A1	A1	A1		A1	(Freibrüter, meist hoch in Bäumen ( <a href="#">Link</a> ))	* (3.500-7.000)	Nein
	Elster ( <i>Pica pica</i> )					A1					(Freibrüter in Bäumen ( <a href="#">Link</a> ))	* (5.000-8.000)	Nein
	Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )	Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )	Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )		Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel		Gastvogel	(Freibrüter in Nadelbäumen ( <a href="#">Link</a> ))	* (10-100)	Nein

	Fitis ( <i>Phylloscopus trochilus</i> )		Fitis ( <i>Phylloscopus trochilus</i> )					A2 (1)			(brütet meist am Boden <a href="#">[Link]</a> )	* (6.000-10.000)	Nein
		Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )		A2 (3)	A2 (1)	A2 (1)	B4 (1)	Nest hinter loser Rinde / in Baumspalten <a href="#">[Link]</a> , spezielle Nisthilfen <a href="#">[Link]</a>	* (5.000-10.000)	Nein
	Gartengras-mücke ( <i>Sylvia borin</i> )				Gartengras-mücke ( <i>Sylvia borin</i> )		A2 (1)			A2 (1)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-17.000)	Nein
			Gebirgs-stelze ( <i>Motacilla cinerea</i> )	Gebirgs-stelze ( <i>Motacilla cinerea</i> )				A2 (1)	A1		(brütet frei in Ufernähe <a href="#">[Link]</a> )	* (500-1.500)	Nein
	Gimpel ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )		Gimpel ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )				B3 (1)	B3 (1)			(Freibrüter, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-7.000)	Nein
	Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )	Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )	Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )		Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )		B3 / B4 (2-3)	A2 (1)	A1	A2 (1)	(Bodenbrüter in dichter Vegetation oder niedrig in Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-20.000)	Nein
		Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )	Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )					Nahrungsgast	Nahrungsgast		(Koloniebrüter in alten Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (200-250)	Nein
		Grauschnäpper ( <i>Muscicapa striata</i> )			Grauschnäpper ( <i>Muscicapa striata</i> )			C11a (1)		C11a / A2 (1)	Freibrüter, Halbhöhlenkästen, <a href="#">Annahme [Link]</a>	* 1.000-2.000	Nein
	Grauspecht ( <i>Picus canus</i> )						A2 (1)				<b>(Bau eigener oder Adaption bestehender Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a>)</b>	<b>1 (30-80)</b>	Ja
	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )		Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )		B3 / B4 (1)	A2 (1)	A2 (1)	A2 (1)	<b>(Brut meist in verlassenen Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a>)</b>	* (1.000-2.000)	Ja
	Hausrotschwanz ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )							Gastvogel			(Höhlenbrüter, aber meist an Gebäuden <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-20.000)	Nein

		Heckenbraunelle ( <i>Prunella modularis</i> )				A2 (1)				(meist Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* 15.000-30.000)	Nein
		Kernbeißer ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )	Kernbeißer ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )	Kernbeißer ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )		B4 (1-2)		A2 (1)		(brütet frei, meist hoch in Laubbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000-3.000)	Nein
	Klappergrasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )		Klappergrasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )			A2 (1)		B4 (1-2)		(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-6.000)	Nein
	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	B4 (2)	A2 / C11a (3)	C11a / C13a (>3)	A2 (2)	C11a / B7 (2)	* (10.000-20.000)	Nein
	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	B4 / C11a (>3)	B7 / C11a (>3)	C11a / C13a (>3)	B9 (2)	C11a (>3)	* (60.000-100.000)	Nein
	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )	A1	A1	A1		A1	* (800-1.600)	Ja
			Mandarinente ( <i>Aix galericulata</i> )					B9 (1)		Höhlenbrüter in Baumhöhlen <a href="#">[Link]</a>	Etabliertes Neozoon (5-15)	Nein
		Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> )	Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> )			A1		A2 (1)		(eigene Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000-1.500)	Ja
		Misteldrossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )			Misteldrossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )		A1		A2 (1)	(brütet frei, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* 1.000-3.000)	Nein
	Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	B4 (1-2)	B4 (2)	A2 (1)	A2 (5)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (30.000-70.000)	Nein
					Neuntöter ( <i>Lanius collurio</i> )				A1	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000-2.000)	Ja

				<b>Pirol (Oriolus oriolus)</b>				<b>A2 (1)</b>	(Freibrüter, hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	<b>V (150-300)</b>	<b>Nein</b>
		Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )				A1			(Freibrüter, hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (5.000- 10.000)	Nein
	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )		Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	B4 (1)		B4 (1-2)	A2 (2)	(brütet frei, meist in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (15.000- 25.000)	Nein
	Rot- kehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rot- kehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	B4 / C11a (1)	A2 (2)	B4 (2-3)	A1	Freibrüter, Halb- höhlenkasten, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a>	* (40.000- 60.000)	Nein
		Schwanz- meise ( <i>Aegithalos caudatus</i> )	Schwanz- meise ( <i>Aegithalos caudatus</i> )	Schwanz- meise ( <i>Aegithalos caudatus</i> )		A1	B3 (1)		(Kugelnest in Bäumen oder Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000- 4.000)	Nein
		<b>Schwarz- specht (<i>Dryocopus martius</i>)</b>		<b>Schwarz- specht (<i>Dryocopus martius</i>)</b>		außerhalb der Brutzeit			<b>(eigene Specht- höhlen <a href="#">[Link]</a>)</b>	* (250-500)	Ja
	Silberreiher ( <i>Casmerodius albus</i> )					Gastvogel			<b>(Kolonien in Schilf- beständen <a href="#">[Link]</a>)</b>	<b>im Saarland kein Brutvogel</b>	Ja
	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	A2 (1)	A2 (3)	A2 (3)		(brütet frei, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000- 20.000)	Nein
	Sperber ( <i>Accipiter nissus</i> )					A1			<b>(Horst meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a>)</b>	* (300-500)	Ja
	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )			Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )		A1			Höhlenbrüter, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a>	* (25.000- 40.000)	Nein
		Stockente ( <i>Anas platy- rhynchos</i> )					B3 (2)		(Bodenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000- 4.000)	Nein
	Sumpf- meise ( <i>Parus palustris</i> )		Sumpf- meise ( <i>Parus palustris</i> )	Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )	B4 (1-2)		A2 (1)	A2 (2)	Höhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a>	* (5.000- 15.000)	Nein
	Tannen- meise ( <i>Parus ater</i> )	Tannen- meise ( <i>Parus ater</i> )		Tannen- meise ( <i>Parus ater</i> )		A2 (1)	A2 (1)	A2 (1)	Höhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a>	* (8.000- 15.000)	Nein

		<b>Trauerschnäpper</b> ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )	<b>Trauerschnäpper</b> ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )				<b>C11a</b> (1)	<b>C11a</b> (3)			<b>Höhlenbrüter, Annahme</b> ( <a href="#">Link</a> )	<b>3</b> (500-1.500)	<b>Nein</b>
					<b>Wacholderdrossel</b> ( <i>Turdus pilaris</i> )					<b>A1</b>	<b>(brütet frei in Bäumen)</b> ( <a href="#">Link</a> )	<b>V</b> (1.000-3.000)	<b>Nein</b>
				Weidenmeise ( <i>Poecile montanus</i> )					<b>B3</b> (1)		Höhlenbrüter, potenziell, aber zimmert sich meistens ihre eigenen Höhlen ( <a href="#">Link</a> )	<b>*</b> (2.000-6.000)	<b>Nein</b>
	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	B4 (1-2)	B4 (1-2)	B4 (2-3)	A2 (3)	A2 (6)	(verstecktes Kugelnest ( <a href="#">Link</a> ), spezielle Nisthilfen erhältlich ( <a href="#">Link</a> ))	<b>*</b> (25.000-50.000)	<b>Nein</b>
	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )		Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	B4 (1-2)	B4 (1)	B4 (2-3)		A2 (1)	(Kugelnest in Bodenvegetation ( <a href="#">Link</a> ))	<b>*</b> (30.000-70.000)	<b>Nein</b>
<b>Berschweiler (Rohrbach)</b>	Insgesamt 22 Arten (18 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 25 Arten (23 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 37 Arten (33 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 33 Arten (29 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 20 Arten (20 mögliche bis sichere Brutvögel)	Mind. 21 BP	Mind. 25 BP	Mind. 43 BP	Mind. 65 BP	Mind. 30 BP			
<b>Begehungen:</b> N = 1 (1 während der Brutzeit)	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	B4 (1)	A2 (1)	A2 (1-2)	B4 (3-4)	A2 (2)	Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen ( <a href="#">Link</a> )	<b>*</b> (80.000-120.000)	<b>Nein</b>
29.04.2025	Bachstelze ( <i>Motacilla alba</i> )		Bachstelze ( <i>Motacilla alba</i> )	Bachstelze ( <i>Motacilla alba</i> )		A1		A1	A1		Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen ( <a href="#">Link</a> )	<b>*</b> (3.000-6.000)	<b>Nein</b>
					<b>Baumpieper</b> ( <i>Anthus trivialis</i> )					A2 (1)	<b>(Nest in Bodenvegetation)</b> ( <a href="#">Link</a> )	<b>V</b> (1.000-3000)	<b>Nein</b>
	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )		A2 (2)	B4 (2)	B4 (2-3)	B7 (5)	<b>C11a</b> (>1)	Höhlenbrüter, Annahme ( <a href="#">Link</a> )	<b>*</b> (40.000-60.000)	<b>Nein</b>

	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	B4 (1)	B4 (1)	B4 (3-4)	B4 (5-6)	A2 (4)	(Freibrüter auf Bäumen/in Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (50.000-70.000)	Nein
	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	außerhalb der Brutzeit	B4 (1)	A2 (1-2)	A1	A2 (1)	(eigene Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a> )	* (4.000-8.000)	Nein
	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )		A1	A1	A1	A1		(Freibrüter, meist hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (3.500-7.000)	Nein
				Eisvogel ( <i>Alcedo atthis</i> )				A1	A1		<b>(Bruthöhlen in Steilufern <a href="#">[Link]</a>, potenziell auch im Gebiet möglich)</b>	* (100-200)	Ja
		Elster ( <i>Pica pica</i> )	Elster ( <i>Pica pica</i> )				A1	A1			(Freibrüter in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (5.000-8.000)	Nein
	Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )	Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )		Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )		Gastvogel	Gastvogel		Gastvogel		(Freibrüter in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10-100)	Nein
			<b>Feldlerche (<i>Alauda arvensis</i>)</b>					<b>A2 (1)</b>			<b>(Bodenbrüter <a href="#">[Link]</a>)</b>	<b>V (6.000-12.000)</b>	<b>Nein</b>
					Fitis ( <i>Phylloscopus trochilus</i> )					A2 (2)	(brütet meist am Boden <a href="#">[Link]</a> )	* (6.000-10.000)	Nein
		Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )			A2 (1)	B4 (1)	A2 (2)		Nest hinter loser Rinde/in Baumspalten <a href="#">[Link]</a> , spezielle Nisthilfen <a href="#">[Link]</a>	* (5.000-10.000)	Nein
			Gartengrasmücke ( <i>Sylvia borin</i> )					A2 (1)			(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-17.000)	Nein
	Gebirgsstelze ( <i>Motacilla cinerea</i> )	Gebirgsstelze ( <i>Motacilla cinerea</i> )	Gebirgsstelze ( <i>Motacilla cinerea</i> )			außerhalb der Brutzeit	B3 (1)	<b>C11a (1)</b>			brütet in Ufernähe, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a> )	* (500-1.500)	Nein
			Gimpel ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )					A1			(Freibrüter, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-7.000)	Nein

		Grünfink ( <i>Carduelis chloris</i> )				A1			(Freibrüter, meist in Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-15.000)	Nein
	Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )		Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )			B4 (1)		A2 (1)	(Bodenbrüter in dichter Vegetation oder niedrig in Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-20.000)	Nein
			Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )	Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )				C11a / C12 (1)	(Koloniebrüter in alten Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (200-250)	Nein
	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	A2 (1)	B4 (1)			(Brut meist in verlassenen Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000-2.000)	Ja
				Jagdfasan ( <i>Phasianus colchicus</i> )					(Bodenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	Etabliertes Neozoon (1.000-3.000)	Nein
			Kanadagans ( <i>Branta canadensis</i> )	Kanadagans ( <i>Branta canadensis</i> )				B3 (1)	(Bodenbrüter <a href="#">[Link]</a> , am Fischweiher)	Etabliertes Neozoon (40-60)	Nein
			Kernbeißer ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )	Kernbeißer ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )				A2 (1)	(brütet frei, meist hoch in Laubbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000-3.000)	Nein
				Klappergrasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )					(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-6.000)	Nein
	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	A2 (1)	C11a / C13a (1)		B4 (1)	Höhlenbrüter, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a>	* (10.000-20.000)	Nein
	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	A2 (3)	C11a, C12 (1)		B7 (3-4)	Höhlenbrüter, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a>	* (60.000-100.000)	Nein
	Kolkrabe ( <i>Corvus corax</i> )	Kolkrabe ( <i>Corvus corax</i> )			Nahrungsgast	Nahrungsgast			(Horst meist auf Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (15-30)	Nein
				Kuckuck ( <i>Cuculus canorus</i> )					(Brutparasit <a href="#">[Link]</a> )	2 (100-300)	Nein
		Mäusebussard	Mäusebussard	Mäusebussard		A1		A1	(Horst hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (800-1.600)	Ja

		<b>(Buteo buteo)</b>	<b>(Buteo buteo)</b>	<b>(Buteo buteo)</b>	<b>(Buteo buteo)</b>								
			Mistel-drossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )	Mistel-drossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )	Mistel-drossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )			A2 (1)	A2 (1)	A2 (1)	(brütet frei, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* 1.000-3.000)	Nein
	Mittel-specht ( <i>Dendrocopos medius</i> )	Mittel-specht ( <i>Dendrocopos medius</i> )		Mittel-specht ( <i>Dendrocopos medius</i> )		A1	A2 (1)		A2 (2)		(eigene Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000-1.500)	Ja
		Mönchs-grasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchs-grasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchs-grasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchs-grasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )		B4 (>2)	B4 (3-4)	B4 (5-6)	A2 (3)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (30.000-70.000)	Nein
		Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )			A1	A1	B5 (1)		(Freibrüter, hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (5.000-10.000)	Nein
			Rauch-schwalbe ( <i>Hirundo rustica</i> )					Nahrungs-gast			(Nester meist in Stallungen <a href="#">[Link]</a> )	3 (3.000-6.000)	Nein
	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )		Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	B4 (1)		B4 (2)	B4 (2-3)	A2 (2)	(brütet frei, meist in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (15.000-25.000)	Nein
	Rot-kehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rot-kehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	B4 (1)	B4 (>2)	C12 (3-4)	C12 (7-8)	A2 (3)	Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen <a href="#">[Link]</a> )	* (40.000-60.000)	Nein
			Rotmilan ( <i>Milvus milvus</i> )					Nahrungs-gast			(Horst meist in alten Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (80-100)	Ja
			Schwanz-meise ( <i>Aegithalos caudatus</i> )					A1			(Kugelnest in Bäumen oder Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-4.000)	Nein
			Schwarz-specht ( <i>Dryocopus martius</i> )	Schwarz-specht ( <i>Dryocopus martius</i> )				außerhalb der Brutzeit	A2 (1)		(eigene Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a> )	* (250-500)	Ja
				Schwarz-storch ( <i>Ciconia nigra</i> )					Nahrungs-gast		(Horst in hohen alten Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (1-5)	Ja

			Silberreiher ( <i>Casmerodius albus</i> )	Silberreiher ( <i>Casmerodius albus</i> )				Gastvogel	Gastvogel		(Kolonien in Schilf- beständen [ <a href="#">Link</a> ])	im Saarland kein Brutvogel	Ja
	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	B4 (2)	A2 (1)	B4 (3)	B4 (1-2)	A2 (2)	(brütet frei, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000- 20.000)	Nein
			Sommer- gold- hähnchen ( <i>Regulus ignicapillus</i> )	Sommer- gold- hähnchen ( <i>Regulus ignicapillus</i> )				A2 (1)	A2 (1)		(Kugelnest, meist in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000- 20.000)	Nein
	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	X	C11a / C16 (3)	A2 / C11a (2)	A2 / C11a (3)	C16 / C11a (2)	C11a (2)	Höhlenbrüter, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a>	* (25.000- 40.000)	Nein
			Stockente ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	Stockente ( <i>Anas platyrhynchos</i> )				C12 (1-2)	B3 (1)		(Boden-brüter <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000- 4.000)	Nein
	Sumpf- meise ( <i>Parus palustris</i> )	Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )	Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )			A2 (1)	A2 / C11a (2)	A1	A2 (1)		Höhlenbrüter, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a>	* (5.000- 15.000)	Nein
				Tannen- meise ( <i>Parus ater</i> )					A2 (1)		Höhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a>	* (8.000- 15.000)	Nein
	Weiden- meise ( <i>Poecile montanus</i> )					A2 (1)					Höhlenbrüter, potenziell, aber zimmert sich meistens ihre eigenen Höhlen <a href="#">[Link]</a>	* (2.000- 6.000)	Nein
	Wintergold- hähnchen ( <i>Regulus regulus</i> )	Wintergold- hähnchen ( <i>Regulus regulus</i> )	Wintergold- hähnchen ( <i>Regulus regulus</i> )	Wintergold- hähnchen ( <i>Regulus regulus</i> )			A2 (1)	A2 (1)	A2 (2)		(Kugelnest in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000- 20.000)	Nein
	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	A2 (1)	B4 (>2)	B4 (3)	B4 (4-5)	A2 (1)	(verstecktes Kugelnest <a href="#">[Link]</a> , spezielle Nisthilfen erhältlich <a href="#">[Link]</a> )	* (25.000- 50.000)	Nein
	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	A2 (1)	B4 (>2)	B4 (3)	B4 (4-5)	A2 (3)	(Kugelnest in Bodenvegetation <a href="#">[Link]</a> )	* (30.000- 70.000)	Nein

Berschweiler (Schullandheim)	Insgesamt 58 Arten (46 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 51 Arten (37 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 45 Arten (36 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 39 Arten (34 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 40 Arten (36 mögliche bis sichere Brutvögel)	Mind. 79 BP	Mind. 57 BP	Mind. 68 BP	Mind. 90 BP	Mind. 98 BP			
Begehungen: N = 2 (1 während der Brutzeit)	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	B9 (1)	A2 (3)	C14b (>2)	B4 (5-6)	A2 (5)	Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen <a href="#">[Link]</a>	* (80.000-120.000)	Nein
(30.01.2025), 02.05.2025		Bachstelze ( <i>Motacilla alba</i> )	Bachstelze ( <i>Motacilla alba</i> )		Bachstelze ( <i>Motacilla alba</i> )		C13a (1)	A1		A1	Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen <a href="#">[Link]</a>	* (3.000-6.000)	Nein
	Bergfink ( <i>Fringilla montifringilla</i> )	Bergfink ( <i>Fringilla montifringilla</i> )				Gastvogel	Gastvogel				(brütet frei in Bäumen und Sträuchern <a href="#">[Link]</a> )	Im Saarland kein Brutvogel	Nein
	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	C11ab / C13a (3)	B4 / C11ab (>1)	C11a / C13a (>3)	C11a (>1)	C11a / B4 (7)	Höhlenbrüter, Annahme <a href="#">[Link]</a>	* (40.000-60.000)	Nein
					Braunkehlchen ( <i>Saxicola rubetra</i> )					Rastvogel	(Bodenbrüter in feuchten Wiesen <a href="#">[Link]</a> )	1 (5-10)	Nein
	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	A2 (2)	B4 (>2)	B4 (>3)	B4 (8-9)	A2 (12)	(Freibrüter auf Bäumen/in Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (50.000-70.000)	Nein
	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	B4 (2)	A1	A1	C16 (2-3)	A2 (4)	(eigene Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a> )	* (4.000-8.000)	Nein
	Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )					B4 (1)					(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-18.000)	Nein
	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	B4 (>1)	A1	A1	A1	A1	(Freibrüter, meist hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (3.500-7.000)	Nein
	Elster ( <i>Pica pica</i> )	Elster ( <i>Pica pica</i> )				A1	A1				(Freibrüter in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (5.000-8.000)	Nein
	Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )	Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )	Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )	Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )	Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	(Freibrüter in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10-100)	Nein

		Fichtenkreuzschnabel ( <i>Loxia curvirostra</i> )					Gastvogel			(Freibrüter in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (50-200)	Nein
	Fitis ( <i>Phylloscopus trochilus</i> )				Fitis ( <i>Phylloscopus trochilus</i> )	B4 (1)			A2 (1)	(brütet meist am Boden <a href="#">[Link]</a> )	* (6.000-10.000)	Nein
	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )		C13a (4)	A2 (1-2)	C13a (>1)	B4 (3-4)	Nest hinter loser Rinde/in Baumspalten <a href="#">[Link]</a> , spezielle Nisthilfen <a href="#">[Link]</a>	* (5.000-10.000)	Nein
	Gartengrasmücke ( <i>Sylvia borin</i> )		Gartengrasmücke ( <i>Sylvia borin</i> )	Gartengrasmücke ( <i>Sylvia borin</i> )	Gartengrasmücke ( <i>Sylvia borin</i> )		A2 (1)	B4 (1)	A2 (1)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-17.000)	Nein
		Gartenrotschwanz ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> )	Gartenrotschwanz ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> )	Gartenrotschwanz ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> )	Gartenrotschwanz ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> )		B4 / C11ab (1)	B4 (1)	A2 (1)	Höhlen- und Halbhöhlenbrüter, Annahme <a href="#">[Link]</a>	* (2.000-5.000)	Nein
	Gimpel ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )	Gimpel ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )	Gimpel ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )	Gimpel ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )	Gimpel ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )		A1	A1	A1	(Freibrüter, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-7.000)	Nein
	Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )	Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )	Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )	Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )	Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )		B4 (2)	A2 (1)	A2 (2)	(Bodenbrüter in dichter Vegetation oder niedrig in Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-20.000)	Nein
	Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )	Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )	Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )	Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )	Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )		Nahrungsgast	Nahrungsgast	Nahrungsgast	(Koloniebrüter in alten Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (200-250)	Nein
	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )		B4 (2)	B4 (2)	B4 (1-2)	(Brut meist in verlassenen Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000-2.000)	Ja
		Habicht ( <i>Accipiter gentilis</i> )					A1			(Horst meist hoch auf Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (50-100)	Ja
	Haubenmeise	Haubenmeise	Haubenmeise	Haubenmeise			A1	außerhalb der Brutzeit		Höhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a>	* (2.000-5.000)	Nein

	( <i>Parus cristatus</i> )	( <i>Parus cristatus</i> )	( <i>Parus cristatus</i> )										
	Hausrotschwanz ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )				Hausrotschwanz ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )	A2 (1)			A2 (1)	(Höhlenbrüter, aber meist an Gebäuden <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-20.000)	Nein	
	Heckenbraunelle ( <i>Prunella modularis</i> )				Heckenbraunelle ( <i>Prunella modularis</i> )	B4 (1-2)			B4 (2)	(meist Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* 15.000-30.000)	Nein	
	Hohltaube ( <i>Columba oenas</i> )	Hohltaube ( <i>Columba oenas</i> )	Hohltaube ( <i>Columba oenas</i> )	Hohltaube ( <i>Columba oenas</i> )	Hohltaube ( <i>Columba oenas</i> )	B4 (3)	A2 (1-2)	A2 (1)	A2 (2)	Höhlenbrüter, z.B. in verlassenen Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a> , spezielle bzw. Waldkauznistkästen <a href="#">[Link]</a>	* (400-800)	Nein	
	Jagdfasan ( <i>Phasianus colchicus</i> )			Jagdfasan ( <i>Phasianus colchicus</i> )	Jagdfasan ( <i>Phasianus colchicus</i> )	B4 (1)			B4 (1)	(Bodenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	Etabliertes Neozoon (1.000-3.000)	Nein	
	Kernbeißer ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )	Kernbeißer ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )	Kernbeißer ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )	Kernbeißer ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )		B4 (2-3)	B4 (1-2)	A2 (2)	A2 (1-2)	(brütet frei, meist hoch in Laubbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000-3.000)	Nein	
	Klappergrasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )	Klappergrasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )	Klappergrasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )	Klappergrasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )	Klappergrasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )	B4 (1)	B4 (1)	B4 (1)	B4 (1)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-6.000)	Nein	
	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	B4 (3)	B4 (>1)	C11a, B9 (5-6)	B4 (2-3)	Höhlenbrüter, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a>	* (10.000-20.000)	Nein	
	Kleinspecht ( <i>Dendrocopos minor</i> )									(eigene Spechthöhlen in morschen Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	V (250-500)	Nein	
	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	B4 / C11ab (2)	C11ab / C13a (>2)	C11a / C13a (>6)	C11a (>2)	Höhlenbrüter, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a>	* (60.000-100.000)	Nein	
	Kolkrabe ( <i>Corvus corax</i> )	Kolkrabe ( <i>Corvus corax</i> )	Kolkrabe ( <i>Corvus corax</i> )			Nahrungsgast	Nahrungsgast	A2 (1)		(Horst meist auf Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (15-30)	Nein	

	Kuckuck ( <i>Cuculus canorus</i> )					A2 (1)				(Brutparasit <a href="#">[Link]</a> )	2 (100-300)	Nein
	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )	C12 (1)	C12 (1)	C12 (1)	C12 (1)	(Horst hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (800-1.600)	Ja
	Mehlschwalbe ( <i>Delichon urbicum</i> )	Mehlschwalbe ( <i>Delichon urbicum</i> )				Nahrungsgast	Nahrungsgast			(Lehmnester meist an Gebäuden <a href="#">[Link]</a> , spezielle Nisthilfen erhältlich <a href="#">[Link]</a> )	3 (6.000-12.000)	Nein
	Misteldrossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )	Misteldrossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )	Misteldrossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )	Misteldrossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )	Misteldrossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )	B4 (2)	B4 (2)	B4 (2)	B4 (1-2)	(brütet frei, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* 1.000-3.000	Nein
	Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> )	Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> )	Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> )	Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> )	Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> )	B4 (2-3)	B4 (2-3)	B4 (1-2)	A2 (1)	(eigene Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000-1.500)	Ja
	Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	A2 (1-2)	B4 (4)	B4 (>3)	B4 (7-8)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (30.000-70.000)	Nein
					Nilgans ( <i>Alopochen aegyptiaca</i> )				Nahrungsgast	(Bruten am Boden, auf Bäumen und in Baumhöhlen <a href="#">[Link]</a> )	Etabliertes Neozoen (20-60)	Nein
	Neuntöter ( <i>Lanius collurio</i> )					C12 (1)				(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000-2.000)	Ja
	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	A1	A1	A1		(Freibrüter, hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (5.000-10.000)	Nein
	Rauchschwalbe ( <i>Hirundo rustica</i> )	Rauchschwalbe ( <i>Hirundo rustica</i> )				Nahrungsgast	Nahrungsgast		Nahrungsgast	(Nester meist in Stallungen <a href="#">[Link]</a> )	3 (3.000-6.000)	Nein
			Ringdrossel ( <i>Turdus torquatus</i> )					Rastvogel		(Nischen-Freibrüter <a href="#">[Link]</a> )	im Saarland kein Brutvogel	Nein
	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	B4 (1-2)	A2 (5)	B4 (2-3)	B4 (4)	(brütet frei, meist in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (15.000-25.000)	Nein

	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	A2 (>1)	A2 (>1)	B4, C12 (1-2)	C12 (6-7)	A2 (5)	Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen <a href="#">[Link]</a>	* (40.000-60.000)	Nein
	Rotmilan ( <i>Milvus milvus</i> )	Rotmilan ( <i>Milvus milvus</i> )	Rotmilan ( <i>Milvus milvus</i> )			Nahrungsgast	Nahrungsgast	Nahrungsgast			(Horst meist in alten Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (80-100)	Ja
	Schwanzmeise ( <i>Aegithalos caudatus</i> )	Schwanzmeise ( <i>Aegithalos caudatus</i> )	Schwanzmeise ( <i>Aegithalos caudatus</i> )	Schwanzmeise ( <i>Aegithalos caudatus</i> )		Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	A2 (1)		(Kugelnest in Bäumen oder Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-4.000)	Nein
			Schwarzmilan ( <i>Milvus migrans</i> )					Nahrungsgast			(Horst meist in alten Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (25-50)	Ja
	Schwarzspecht ( <i>Dryocopus martius</i> )	Schwarzspecht ( <i>Dryocopus martius</i> )	Schwarzspecht ( <i>Dryocopus martius</i> )	Schwarzspecht ( <i>Dryocopus martius</i> )	Schwarzspecht ( <i>Dryocopus martius</i> )	B5 (1)	A1	A2 (>1)	A2 (1)	A2 (1)	(eigene Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a> )	* (250-500)	Ja
	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	B4 (2)	B4 (>1)	B4 (2)	B4 (3-4)	A2 (1)	(brütet frei, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-20.000)	Nein
	Sommergoldhähnchen ( <i>Regulus ignicapillus</i> )		Sommergoldhähnchen ( <i>Regulus ignicapillus</i> )	Sommergoldhähnchen ( <i>Regulus ignicapillus</i> )	Sommergoldhähnchen ( <i>Regulus ignicapillus</i> )	A2 (2)		A2 (2)	B4 (2-3)	B4 (>1)	(Kugelnest, meist in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-20.000)	Nein
	Sperber ( <i>Accipiter nisus</i> )	Sperber ( <i>Accipiter nisus</i> )				A1	außerhalb der Brutzeit				(Horst meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (300-500)	Ja
	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	C16 (1)	A2 (>1)	A2 (1)	A2 (1)	C13a / C11a (2)	Höhlenbrüter, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a>	* (25.000-40.000)	Nein
	Stieglitz ( <i>Carduelis carduelis</i> )					B4 (1-2)					(Freibrüter in Gehölzen <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-5.000)	Nein
	Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )	Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )	Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )	Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )	Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )	B4 (3)	A2 / C11a (>2)	A2 / C11a (>2)	A2 (1)	B4 (>1)	Höhlenbrüter, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a>	* (5.000-15.000)	Nein
	Tannenmeise ( <i>Parus ater</i> )	Tannenmeise ( <i>Parus ater</i> )	Tannenmeise ( <i>Parus ater</i> )	Tannenmeise ( <i>Parus ater</i> )	Tannenmeise ( <i>Parus ater</i> )	B4 (4)	A2 / C11a (>1)	A2 (3)	C11a (4-5)	B4 (1)	Höhlenbrüter, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a>	* (8.000-15.000)	Nein

	Trauerschnäpper ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )	Trauerschnäpper ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )	Trauerschnäpper ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )	Trauerschnäpper ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )	Trauerschnäpper ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )	B9 / C11a (2)	C11a (1)	C11a (1)	C11a (1-2)	A2 (1)	Höhlenbrüter, Annahme <a href="#">[Link]</a>	3 (500-1.500)	Nein
	Turmfalke ( <i>Falco tinnunculus</i> )	Turmfalke ( <i>Falco tinnunculus</i> )	Turmfalke ( <i>Falco tinnunculus</i> )	Turmfalke ( <i>Falco tinnunculus</i> )		Nahrungsgast	Nahrungsgast	Nahrungsgast	Nahrungsgast		(brütet meist in hohen Gebäuden wie Kirchtürmen <a href="#">[Link]</a> , spezielle Nisthilfen erhältlich <a href="#">[Link]</a> )	* (700-1.000)	Ja
	Turteltaube ( <i>Streptopelia turtur</i> )				Turteltaube ( <i>Streptopelia turtur</i> )	A2 (1)				A2 (1)	(brütet frei in Bäumen und Hecken <a href="#">[Link]</a> )	2 (150-300)	Nein
	Wacholderdrossel ( <i>Turdus pilaris</i> )	Wacholderdrossel ( <i>Turdus pilaris</i> )			Wacholderdrossel ( <i>Turdus pilaris</i> )	Gastvogel	Gastvogel			Gastvogel	(brütet frei in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	V (1.000-3.000)	Nein
	Waldbaumläufer ( <i>Certhia familiaris</i> )	Waldbaumläufer ( <i>Certhia familiaris</i> )	Waldbaumläufer ( <i>Certhia familiaris</i> )			A2 (1)	A2 (1)	A2 (1)			Nest hinter loser Rinde/in Baumspalten <a href="#">[Link]</a> , spezielle Nisthilfen <a href="#">[Link]</a>	* (2.000-4.000)	Nein
	Waldlaubsänger ( <i>Phylloscopus sibilatrix</i> )	Waldlaubsänger ( <i>Phylloscopus sibilatrix</i> )				A2 (1)	A2 (1)				(brütet meist in Vertiefungen auf Laub am Boden <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000-3.000)	Nein
	Weidenmeise ( <i>Poecile montanus</i> )	Weidenmeise ( <i>Poecile montanus</i> )				außerhalb der Brutzeit	außerhalb der Brutzeit				Höhlenbrüter, potenziell, aber zimmert sich meistens ihre eigenen Höhlen <a href="#">[Link]</a>	* (2.000-6.000)	Nein
			Wendehals ( <i>Jynx torquilla</i> )					A2 (1)			potenziell, in Baumhöhlen und Nistkästen <a href="#">[Link]</a>	2 (50-100)	Ja
		Wespenbussard ( <i>Pernis apivorus</i> )		Wespenbussard ( <i>Pernis apivorus</i> )			A1		A1		(Horst hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (50-100)	Ja
	Wintergoldhähnchen	Wintergoldhähnchen	Wintergoldhähnchen	Wintergoldhähnchen	Wintergoldhähnchen	B4 (3)	A2 (1-2)	A2 (1)	B4 (1-2)	A2 (2)	(Kugelnest in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-20.000)	Nein

	( <i>Regulus regulus</i> )	( <i>Regulus regulus</i> )	( <i>Regulus regulus</i> )	( <i>Regulus regulus</i> )	( <i>Regulus regulus</i> )								
	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	B4 (2)	B4 (3)	B4 (3)	B4 (5-6)	A2 (6)	(verstecktes Kugelnest <a href="#">[Link]</a> , spezielle Nisthilfen erhältlich <a href="#">[Link]</a> )	* (25.000-50.000)	Nein
	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	A2 (1)	B4 (3)	B4 (3)	B4 (5-6)	B4 (8)	(Kugelnest in Bodenvegetation <a href="#">[Link]</a> )	* (30.000-70.000)	Nein
<b>Eppelborn (Ill/Klingelfloß)</b>	Insgesamt 45 Arten (38 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 52 Arten (40 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 54 Arten (43 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 47 Arten (43 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 51 Arten (41 mögliche bis sichere Brutvögel)	Mind. 56 BP	Mind. 70 BP	Mind. 90 BP	Mind. 90 BP	Mind. 76 BP			
<b>Begehungen: N = 5 (4 während Brutzeit)</b>	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	B3 (3)	<b>C11a, C12 (&gt;5)</b>	B4 (3-4)	B4 (>5)	B4 (4)	Freibrüter, Halbhöhlenkästen, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a>	* (80.000-120.000)	Nein
07.02.2025, 23.04.2025, 29.04.2025, 12.06.2025, (05.11.2025)	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	B4 (3)	<b>C11a, C13a (&gt;6)</b>	<b>C11a, B4-6 (&gt;3)</b>	<b>C11a (&gt;2)</b>	<b>C12 / C11a (&gt;4)</b>	Höhlenbrüter, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a>	* (40.000-60.000)	Nein
	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	B4 (2)	B3 (>4)	B4 (2-3)	B4 (>3)	B4 (2)	(Freibrüter auf Bäumen/in Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (50.000-70.000)	Nein
	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	B3 (1)	A1	A2 (2)	A2 (>2)	A2 (1)	(eigene Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a> )	* (4.000-8.000)	Nein
	Dohle ( <i>Coloeus monedula</i> )	Dohle ( <i>Coloeus monedula</i> )					Gastvogel				Höhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a> , aber auch spezielle Nistkästen erhältlich <a href="#">[Link]</a>	* (1.500-3.000)	Nein
	Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )	Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )	Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )		Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )	B4 (4-5)	B4 (3)	B4 (3)		B4 (2)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-18.000)	Nein
		Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )		A1	A1	A1	A1	(Freibrüter, meist hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (3.500-7.000)	Nein

	Eisvogel ( <i>Alcedo atthis</i> )		Eisvogel ( <i>Alcedo atthis</i> )	Eisvogel ( <i>Alcedo atthis</i> )	Eisvogel ( <i>Alcedo atthis</i> )	A1		A1	Nahrungsgast	A1	(Bruthöhlen in Steilufern <a href="#">[Link]</a> , potenziell auch im Gebiet möglich)	* (100-200)	Ja
	Elster ( <i>Pica pica</i> )	Elster ( <i>Pica pica</i> )	Elster ( <i>Pica pica</i> )	Elster ( <i>Pica pica</i> )	Elster ( <i>Pica pica</i> )	A1	A1	A1	A1	A1	(Freibrüter in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (5.000-8.000)	Nein
	Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )	Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )	Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )	Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )	Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )	Gastvogel	Gastvogel	<b>Gastvogel</b>	Gastvogel	Gastvogel	(Freibrüter in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10-100)	Nein
					<b>Feldschwirl (<i>Locustella naevia</i>)</b>					<b>A2 (1)</b>	<b>(Bodenbrüter in dichter Vegetation <a href="#">[Link]</a>)</b>	<b>3 (400-800)</b>	<b>Nein</b>
		Fitis ( <i>Phylloscopus trochilus</i> )	Fitis ( <i>Phylloscopus trochilus</i> )		Fitis ( <i>Phylloscopus trochilus</i> )		A2 (1-2)	A2 (1)		A2 (1)	(brütet meist am Boden <a href="#">[Link]</a> )	* (6.000-10.000)	Nein
	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	A1	A2 (1-2)	A2 (1)	B4 (1-2)	A2 (1)	Nest hinter loser Rinde/in Baumspalten <a href="#">[Link]</a> , spezielle Nisthilfen <a href="#">[Link]</a>	* (5.000-10.000)	Nein
	Gartengrasmücke ( <i>Sylvia borin</i> )	Gartengrasmücke ( <i>Sylvia borin</i> )	Gartengrasmücke ( <i>Sylvia borin</i> )	Gartengrasmücke ( <i>Sylvia borin</i> )	Gartengrasmücke ( <i>Sylvia borin</i> )	B4 (2)	B4 (1-2)	A2 (1)	A2 (1)	B4 (2)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-17.000)	Nein
			Gartenrotschwanz ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> )	Gartenrotschwanz ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> )				B4 (1-2)	A2 (1)		Höhlen- und Halbhöhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a>	* (2.000-5.000)	Nein
	Gebirgsstelze ( <i>Motacilla cinerea</i> )	Gebirgsstelze ( <i>Motacilla cinerea</i> )	Gebirgsstelze ( <i>Motacilla cinerea</i> )	Gebirgsstelze ( <i>Motacilla cinerea</i> )	Gebirgsstelze ( <i>Motacilla cinerea</i> )	A1	B3 (1)	A1	<b>C11a (1)</b>	<b>C12 / C11a (1)</b>	(brütet frei in Ufernähe, <a href="#">Annahme <a href="#">[Link]</a></a> )	* (500-1.500)	Nein
	Gimpel ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )	Gimpel ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )	Gimpel ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )	Gimpel ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )	Gimpel ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )	B3 (1)	A1	B3 (1)	A1	A1	(Freibrüter, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-7.000)	Nein
				Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )					B3 (1)		(Bodenbrüter in dichter Vegetation oder niedrig in Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-20.000)	Nein

	Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )	Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )	Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )	Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )	Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )	Nahrungsgast	Nahrungsgast	Nahrungsgast	Nahrungsgast	Nahrungsgast	(Koloniebrüter in alten Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (200-250)	Nein
			Grauschnäpper ( <i>Muscicapa striata</i> )		Grauschnäpper ( <i>Muscicapa striata</i> )			<b>C11a</b> (1)		<b>C11a / A2</b> (1)	Freibrüter, Halbhöhlenkasten, <a href="#">Annahme</a> <a href="#">[Link]</a>	* 1.000-2.000	Nein
	Grauspecht ( <i>Picus canus</i> )					A2 (1)					<b>(Bau eigener oder Adaption bestehender Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a>)</b>	<b>1</b> <b>(30-80)</b>	Ja
	Grünfink ( <i>Carduelis chloris</i> )	Grünfink ( <i>Carduelis chloris</i> )	Grünfink ( <i>Carduelis chloris</i> )	Grünfink ( <i>Carduelis chloris</i> )	Grünfink ( <i>Carduelis chloris</i> )	A1	A2 (1)	B4 (1)	A1	B4 (1)	(Freibrüter, meist in Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-15.000)	Nein
	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	B4 (1-2)	<b>B4</b> <b>(1-2)</b>	<b>B4</b> <b>(2)</b>	<b>B4</b> <b>(1-2)</b>	<b>A2</b> <b>(1)</b>	<b>(Brut meist in verlassenen Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a>)</b>	* <b>(1.000-2.000)</b>	Ja
		Hausrotschwanz ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )	Hausrotschwanz ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )	Hausrotschwanz ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )	Hausrotschwanz ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )		Nahrungsgast (Bruten unter Dächern)	Nahrungsgast (Bruten unter Dächern)	Nahrungsgast (Bruten unter Dächern)	Nahrungsgast (Bruten unter Dächern)	(brütet an Gebäuden <a href="#">[Link]</a> )	* 10.000-20.000	Nein
	Hausperling ( <i>Passer domesticus</i> )	Hausperling ( <i>Passer domesticus</i> )	Hausperling ( <i>Passer domesticus</i> )	Hausperling ( <i>Passer domesticus</i> )	Hausperling ( <i>Passer domesticus</i> )	A1	<b>A1</b> <b>(Bruten unter Dächern)</b>	<b>A1</b> <b>(Bruten unter Dächern)</b>	<b>C11a</b> <b>(1)</b>	<b>A2</b> <b>(&gt;1)</b>	<b>meist Höhlenbrüter, <a href="#">Annahme</a> <a href="#">[Link]</a></b>	<b>V</b> <b>(30.000-60.000)</b>	Nein
	Heckenbraunelle ( <i>Prunella modularis</i> )	Heckenbraunelle ( <i>Prunella modularis</i> )	Heckenbraunelle ( <i>Prunella modularis</i> )	Heckenbraunelle ( <i>Prunella modularis</i> )	Heckenbraunelle ( <i>Prunella modularis</i> )	B4 (1-2)	A2 (1)	B4 (1-2)	B4 (1-2)	B4 (1-2)	(meist Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* 15.000-30.000	Nein
			Jagdfasan ( <i>Phasianus colchicus</i> )					A2 (1)			(Bodenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	Etabliertes Neozoon (1.000-3.000)	Nein
				Hohltaube ( <i>Columba oenas</i> )					A2 (1)		Höhlenbrüter, z.B. in verlassenen Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a> , spezielle bzw. Waldkauznistkästen <a href="#">[Link]</a>	* (400-800)	Nein
	Kanadagans ( <i>Branta canadensis</i> )	Kanadagans ( <i>Branta canadensis</i> )	Kanadagans ( <i>Branta canadensis</i> )	Kanadagans ( <i>Branta canadensis</i> )	Kanadagans ( <i>Branta canadensis</i> )	Nahrungsgast	A1	<b>B3</b> <b>(1)</b>	A1	A1	(Bodenbrüter <a href="#">[Link]</a> , potenziell am Fischweiher)	Etabliertes Neozoon (40-60)	Nein

		Kernbeißer ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )	Kernbeißer ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )			A2 (1)	A2 (2)			(brütet frei, meist hoch in Laubbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000-3.000)	Nein		
		Klappergrasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )	Klappergrasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )			A2 (1)		B4 (1-2)	A2 (1)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-6.000)	Nein		
	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )			C11a (1)	B4 (3)	B9 (>4)	C13a / C11a (>2)	Höhlenbrüter, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a>	* (10.000-20.000)	Nein		
	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )			B4 (5)	C11a, C13a (>6)	C11a, C16 (>10)	C11a (>6)	Höhlenbrüter, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a>	* (60.000-100.000)	Nein		
									A1	(Horst meist auf Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (15-30)	Nein		
	Kormoran ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )	Kormoran ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )	Kormoran ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )			Nahrungsgast	Nahrungsgast	Nahrungsgast	Nahrungsgast	Nahrungsgast	Nahrungsgast	(Koloniebrüter, meist auf hohen Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	im Saarland nur 1 Kolonie an Blies	Nicht mehr
										(Brutparasit <a href="#">[Link]</a> )	2 (100-300)	Nein		
		Mauersegler ( <i>Apus apus</i> )	Mauersegler ( <i>Apus apus</i> )					Nahrungsgast	Nahrungsgast	(brütet an Gebäuden <a href="#">[Link]</a> )	* 2.000-7.000	Nein		
	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )			A1	A1	C12 (1)	C12 (1)	(Horst hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (800-1.600)	Ja		
		Mehlschwalbe ( <i>Delichon urbicum</i> )	Mehlschwalbe ( <i>Delichon urbicum</i> )				Nahrungsgast		Nahrungsgast	(Lehmnester meist an Gebäuden <a href="#">[Link]</a> , spezielle Nisthilfen erhältlich <a href="#">[Link]</a> )	3 (6.000-12.000)	Nein		
	Misteldrossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )					A2 (1)			A2 (1)	(brütet frei, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* 1.000-3.000	Nein		

		Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> )	Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> )	Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> )	Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> )		A2 (1)	außerhalb der Brutzeit	A2 (1)	A2 (1)	(eigene Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000-1.500)	Ja
	Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	B4 (3-4)	B4 (>5)	B4 (8)	B4 (>9)	B4 (9)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (30.000-70.000)	Nein
				Nachtigall ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )					B4 (1)		(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000-2.000)	Nein
					Nilgans ( <i>Alopochen aegyptiaca</i> )					Nahrungsgast	(Bruten am Boden, auf Bäumen und in Baumhöhlen <a href="#">[Link]</a> )	Etabliertes Neozoen (20-60)	Nein
	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	A1	B9 (1)		A1 (Brut oberhalb Fröschengärten)	C11a (2-3)	A1	(Freibrüter, hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (5.000-10.000)
		Rauchschnalbe ( <i>Hirundo rustica</i> )	Rauchschnalbe ( <i>Hirundo rustica</i> )				Nahrungsgast	Nahrungsgast			(Nester meist in Stallungen <a href="#">[Link]</a> )	3 (3.000-6.000)	Nein
	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	B4 (2)	B4 (>3)	C13a, B4 (>4)	B4 (6)	B4 (3)	(brütet frei, meist in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (15.000-25.000)	Nein
	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	B4 (2)	B4 (>3)	B4, C12 (3-4)	B4 (>5)	B4 (>2)	Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen <a href="#">[Link]</a> )	* (40.000-60.000)	Nein
	Rotmilan ( <i>Milvus milvus</i> )	Rotmilan ( <i>Milvus milvus</i> )			Rotmilan ( <i>Milvus milvus</i> )	Nahrungsgast	Nahrungsgast			Nahrungsgast	(Horst meist in alten Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (80-100)	Ja
		Schwanzmeise ( <i>Aegithalos caudatus</i> )		Schwanzmeise ( <i>Aegithalos caudatus</i> )	Schwanzmeise ( <i>Aegithalos caudatus</i> )		Gastvogel		B3 (1)	Gastvogel	(Kugelnest in Bäumen oder Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-4.000)	Nein
	Schwarzspecht ( <i>Dryocopus martius</i> )		Schwarzspecht ( <i>Dryocopus martius</i> )	Schwarzspecht ( <i>Dryocopus martius</i> )		A1		außerhalb der Brutzeit	A1		(eigene Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a> )	* (250-500)	Ja

	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	A2 (1)	A2 (1-2)	B4 (2-3)	B4 (1-2)	B4 (2)	(brütet frei, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-20.000)	Nein
	Sommergoldhähnchen ( <i>Regulus ignicapillus</i> )		Sommergoldhähnchen ( <i>Regulus ignicapillus</i> )	Sommergoldhähnchen ( <i>Regulus ignicapillus</i> )		A2 (2)		A2 (1)	B4 (1-2)		(Kugelnest, meist in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-20.000)	Nein
	Sperber ( <i>Accipiter nisus</i> )	Sperber ( <i>Accipiter nisus</i> )	Sperber ( <i>Accipiter nisus</i> )			A1	A1	A1			(Horst meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (300-500)	Ja
	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )		A1 / C11a (2)	C11a, C13a (>3)	C11a, C15 (>7)	C11a (4)	C13a / C11a (>4)	Höhlenbrüter, Annahme <a href="#">[Link]</a>	* (25.000-40.000)	Nein
	Stieglitz ( <i>Carduelis carduelis</i> )		Stieglitz ( <i>Carduelis carduelis</i> )	Stieglitz ( <i>Carduelis carduelis</i> )		B4 (1-2)		A2 (1)	B4 (1)	A2 (1)	(Freibrüter in Gehölzen <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-5.000)	Nein
	Stockente ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	Stockente ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	Stockente ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	Stockente ( <i>Anas platyrhynchos</i> )		B3 (2-3)	B3 (3)	C12 (2)	C12 (>2)	B3 (>1)	(Bodenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-4.000)	Nein
		Straßentaube ( <i>Columba livia</i> f. <i>domestica</i> )	Straßentaube ( <i>Columba livia</i> f. <i>domestica</i> )				Nahrungsgast	Nahrungsgast			(brütet an Gebäuden <a href="#">[Link]</a> )	Etabliertes Neozoon (5.000-10.000)	Nein
	Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )	Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )	Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )	Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )		B4 (1)	A2 (1)	A2 (3-4)	B4 (1)	A2 (2)	Höhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a>	* (5.000-15.000)	Nein
	Sumpfrohsänger ( <i>Acrocephalus palustris</i> )	Sumpfrohsänger ( <i>Acrocephalus palustris</i> )	Sumpfrohsänger ( <i>Acrocephalus palustris</i> )			B4 (3-4)	B4 (2)	A2 (1)		A2 (1)	(Freibrüter in Dickicht, oft Brennnesseln <a href="#">[Link]</a> )	V (2.000-4.000)	Nein
		Tannenmeise ( <i>Parus ater</i> )	Tannenmeise ( <i>Parus ater</i> )				A2 (1)	außerhalb der Brutzeit			Höhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a>	* (8.000-15.000)	Nein
	Trauerschnäpper ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )		Trauerschnäpper ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )			A2 (1)		C11a (1)			Höhlenbrüter, Annahme <a href="#">[Link]</a>	3 (500-1.500)	Nein
	Turmfalke ( <i>Falco tinnunculus</i> )	Turmfalke ( <i>Falco tinnunculus</i> )	Turmfalke ( <i>Falco tinnunculus</i> )			Nahrungsgast	Nahrungsgast	Nahrungsgast (Baumbrut oberhalb		Nahrungsgast	(brütet meist in hohen Gebäuden wie Kirchtürmen <a href="#">[Link]</a> , spezielle	* (700-1.000)	Ja

	Wacholderdrossel ( <i>Turdus pilaris</i> )	Wacholderdrossel ( <i>Turdus pilaris</i> )				A1	A1	Fröschengarten!)			Nisthilfen erhältlich <a href="#">[Link]</a>		
			Waldkauz ( <i>Strix aluco</i> )		Waldkauz ( <i>Strix aluco</i> )			A2 (1)		A2 (1)	(brütet frei in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	V (1.000-3.000)	Nein
					Wasseramsel ( <i>Cinclus cinclus</i> )						(nur in Baumhöhlen <a href="#">[Link]</a> )	* (700-1.000)	Ja
											Nahrungsgast (Brut in unserer Nisthilfe unter Brücke)	* (100-200)	Nein
		Weidenmeise ( <i>Poecile montanus</i> )	Weidenmeise ( <i>Poecile montanus</i> )	Weidenmeise ( <i>Poecile montanus</i> )			A1	A1	C11a (1)		Höhlenbrüter, <a href="#">Annahme</a> <a href="#">[Link]</a>	* (2.000-6.000)	Nein
					Weißstorch ( <i>Ciconia ciconia</i> )						Nahrungsgast (Brut in Aschbach, Brutversuch Bubach)	* (57)	Ja
		Wespenbussard ( <i>Pernis apivorus</i> )					A2 (1)				(Horst hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (50-100)	Ja
	Wintergoldhähnchen ( <i>Regulus regulus</i> )	Wintergoldhähnchen ( <i>Regulus regulus</i> )					A2 (1)				(Kugelnest in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-20.000)	Nein
	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	B4 (5-6)	B4 (5-6)	B4 (5)	B4 (>6)	B4 (6)	(verstecktes Kugelnest <a href="#">[Link]</a> , spezielle Nisthilfen erhältlich <a href="#">[Link]</a> )	* (25.000-50.000)	Nein
	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	B4 (4-5)	B4 (4-5)	B4 (8)	B4 (>9)	B4 (10)	(Kugelnest in Bodenvegetation <a href="#">[Link]</a> )	* (30.000-70.000)	Nein

Urexweiler (Rübellbach)	Insgesamt 30 Arten (26 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 35 Arten (26 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 31 Arten (27 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 36 Arten (33 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 27 Arten (25 mögliche bis sichere Brutvögel)	Mind. 32 BP	Mind. 30 BP	Mind. 24 BP	Mind. 54 BP	Mind. 45 BP			
<b>Begehungen:</b> N = 2 (2 während der Brutzeit)	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	B3 (2)	B4 (>1)	A2 (1)	B4 (>4)	B4 (3)	Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen ( <a href="#">Link</a> )	* (80.000-120.000)	Nein
23.05.2025, 16.06.2025			Bachstelze ( <i>Motacilla alba</i> )	Bachstelze ( <i>Motacilla alba</i> )	Bachstelze ( <i>Motacilla alba</i> )			A1	A1	C12 (1)	Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen ( <a href="#">Link</a> )	* (3.000-6.000)	Nein
	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	B4 / C11a (3)	C11a, C13a (>2)	A2 (>1)	C11a (>5)	C11a / B4 (>1)	Höhlenbrüter, Annahme ( <a href="#">Link</a> )	* (40.000-60.000)	Nein
	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	B4 (2-3)	A2 (>1)	A2 (2)	B4 (>3)	A2 (3)	(Freibrüter auf Bäumen/in Hecken ( <a href="#">Link</a> ))	* (50.000-70.000)	Nein
	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )		außerhalb der Brutzeit	B4 (1-2)	A2 (1)	A2 (1)		(eigene Spechthöhlen ( <a href="#">Link</a> ))	* (4.000-8.000)	Nein
		Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )	Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )	Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )	Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )		A2 (2)	A2 (1)	B4 (1)	B4 (3)	(Heckenbrüter ( <a href="#">Link</a> ))	* (10.000-18.000)	Nein
	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	A1	A1	A1	A1		(Freibrüter, meist hoch in Bäumen ( <a href="#">Link</a> ))	* (3.500-7.000)	Nein
	Elster ( <i>Pica pica</i> )	Elster ( <i>Pica pica</i> )	Elster ( <i>Pica pica</i> )	Elster ( <i>Pica pica</i> )		außerhalb der Brutzeit	A1	A1	B9 (1)		(Freibrüter in Bäumen ( <a href="#">Link</a> ))	* (5.000-8.000)	Nein
		Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )	Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )	Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )	Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )		Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel		(Freibrüter in Nadelbäumen ( <a href="#">Link</a> ))	* (10-100)	Nein
	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	A2 (2)	A2 (1)	A2 (1)		B4 (1)	Nest hinter loser Rinde/in Baumspalten ( <a href="#">Link</a> ), spezielle Nisthilfen ( <a href="#">Link</a> )	* (5.000-10.000)	Nein

				Garten- grasmücke ( <i>Sylvia borin</i> )	Garten- grasmücke ( <i>Sylvia borin</i> )				B4 (1)	B4 (3)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000- 17.000)	Nein
	Gimpel ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )					A1					(Freibrüter, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000- 7.000)	Nein
		Gartenrot- schwanz ( <i>Phoeni- curus phoeni- curus</i> )			Gartenrot- schwanz ( <i>Phoeni- curus phoeni- curus</i> )		A2 (1)			A2 (1)	Höhlen- und Halb- höhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a>	* (2.000- 5.000)	Nein
	Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )	Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )	Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )	Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )	Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )	A2 (1)	B4 (1-2)	B4 (1)	B4 (2)	B4 (2)	(Bodenbrüter in dichter Vegetation oder niedrig in Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000- 20.000)	Nein
		Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )		Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )			Nahrungs- gast		Nahrungs- gast		(Kolonie-brüter in alten Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (200-250)	Nein
	Grünfink ( <i>Carduelis chloris</i> )					A2 (1)					(Freibrüter, meist in Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000- 15.000)	Nein
	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )		B4 (1)	B4 (1)	A2 (1)	B4 (2)		(Brut meist in verlassenen Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000- 2.000)	Ja
	Hecken- braunelle ( <i>Prunella modularis</i> )		Hecken- braunelle ( <i>Prunella modularis</i> )			A2 (1)		A2 (1)			(meist Hecken- brüter <a href="#">[Link]</a> )	* 15.000- 30.000)	Nein
	Hohltaube ( <i>Columba oenas</i> )	Hohltaube ( <i>Columba oenas</i> )	Hohltaube ( <i>Columba oenas</i> )	Hohltaube ( <i>Columba oenas</i> )	Hohltaube ( <i>Columba oenas</i> )	B4 (1)	B4 (1)	B4 (1)	B4 (1-2)	B4 (3)	Höhlenbrüter, z.B. in verlassenen Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a> , spezielle bzw. Waldkauz- nistkästen <a href="#">[Link]</a>	* (400-800)	Nein
			Jagdhasan ( <i>Phasianus colchicus</i> )		Jagdhasan ( <i>Phasianus colchicus</i> )			B4 (1)		A2 (1)	(Bodenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	Etabliertes Neozoon (1.000- 3.000)	Nein
		Kernbeißer ( <i>Cocco- thraustes cocco- thraustes</i> )		Kernbeißer ( <i>Cocco- thraustes cocco- thraustes</i> )			A2 (2)		B4 (1-2)		(brütet frei, meist hoch in Laub- bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000- 3.000)	Nein

				Klappergrasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )	Klappergrasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )				A2 (1)	A2 (1)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-6.000)	Nein
	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )		B4 (1)	C11a (1)	C11a (1)	A2 (1)		Höhlenbrüter, Annahme <a href="#">[Link]</a>	* (10.000-20.000)	Nein
		Kleinspecht ( <i>Dendrocopos minor</i> )					außerhalb der Brutzeit				(eigene Specht- höhlen in morschen Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	V (250-500)	Nein
	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	B4 / C11a (3-4)	B4 / C11a (3-4)	B4 (>2)	B4, B7 (>3)	C12 / C11a (>1)	Höhlenbrüter, Annahme <a href="#">[Link]</a>	* (60.000-100.000)	Nein
		Mauersegler ( <i>Apus apus</i> )			Mauersegler ( <i>Apus apus</i> )		Nahrungsgast			Nahrungsgast	(brütet an Gebäuden <a href="#">[Link]</a> )	* 2.000-7.000	Nein
	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )	B5 (1-2)	A1	A1	B5 (1)	A1	(Horst hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (800-1.600)	Ja
					Mehlschwalbe ( <i>Delichon urbica</i> )					Nahrungsgast	(Lehmnester meist an Gebäuden <a href="#">[Link]</a> , spezielle Nisthilfen erhältlich <a href="#">[Link]</a> )	3 (6.000-12.000)	Nein
		Mistel- drossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )	Mistel- drossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )	Mistel- drossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )			Gastvogel	A2 (1)	B4 (1-2)		(brütet frei, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* 1.000-3.000	Nein
	Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> )	Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> )	Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> )	Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> )		A2 (1)	außerhalb der Brutzeit	A2 (1)	A2 (1)		(eigene Specht- höhlen <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000-1.500)	Ja
	Mönchs- grasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchs- grasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchs- grasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchs- grasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchs- grasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	A2 (1)	A2 (1)		B4 (>4)	B4 (4)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (30.000-70.000)	Nein
					Nachtigall ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )					A2 (1)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000-2.000)	Nein

		<b>Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)</b>		<b>Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)</b>			<b>A1</b>		<b>A1</b>		<b>(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a>)</b>	<b>* (1.000- 2.000)</b>	<b>Ja</b>
	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	A1	A1	A1	A1	C11a (>1)	(Freibrüter, hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (5.000- 10.000)	Nein
	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	B4 (1-2)	B4 (1-2)	B4 (1)	B4 (>2)	B4 (4)	(brütet frei, meist in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (15.000- 25.000)	Nein
			Rotdrossel ( <i>Turdus iliacus</i> )					Gastvogel			(brütet frei in Napfnester <a href="#">[Link]</a> )	im Saarland kein Brutvogel	Nein
	Rot- kehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rot- kehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	B4 / C11a (2-3)	B4 (2-3)	A2 (1)	B4 (3)	A2 (1)	Freibrüter, Halb- höhlenkästen, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a> )	* (40.000- 60.000)	Nein
	<b>Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)</b>			<b>Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)</b>	<b>Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)</b>	Nahrungs- gast			<b>A1</b>	<b>A1</b>	<b>(Horst meist in alten Bäumen <a href="#">[Link]</a>)</b>	<b>* (80-100)</b>	<b>Ja</b>
		Schwanz- meise ( <i>Aegithalos caudatus</i> )			Schwanz- meise ( <i>Aegithalos caudatus</i> )		Gastvogel			C12 (1)	(Kugelnest in Bäumen oder Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000- 4.000)	Nein
		<b>Schwarz- specht (<i>Dryocopus martius</i>)</b>		<b>Schwarz- specht (<i>Dryocopus martius</i>)</b>			<b>B4 (1)</b>		<b>A2 (1)</b>		<b>(eigene Specht- höhlen <a href="#">[Link]</a>)</b>	<b>* (250-500)</b>	<b>Ja</b>
	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	B4 (1-2)	B4 (1-2)	B4 (1-2)	B4 (>2)	B4 (1)	(brütet frei, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000- 20.000)	Nein
				Sommer- gold- hähnchen ( <i>Regulus ignicapillus</i> )				A2 (1)	A2 (1)		(Kugelnest, meist in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000- 20.000)	Nein
	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	A2 (1-2)	A2 (1-2)	A2 (1-2)	B4 (>5)	C12 (>2)	Höhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a>	* (25.000- 40.000)	Nein
				Stieglitz ( <i>Carduelis carduelis</i> )	Stieglitz ( <i>Carduelis carduelis</i> )				A1	A2 (1)	(Freibrüter in Gehölzen <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000- 5.000)	Nein
	Sumpf- meise		Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )	Sumpf- meise		A2 (1)		A2 (1)	<b>C11a (1)</b>		Höhlenbrüter, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a> )	* (5.000- 15.000)	Nein

	( <i>Parus palustris</i> )			( <i>Parus palustris</i> )									
	Tannenmeise ( <i>Parus ater</i> )	Tannenmeise ( <i>Parus ater</i> )	Turmfalke ( <i>Falco tinnunculus</i> )			B4 (1)	A2 (1)				Höhlenbrüter, potenziell ( <a href="#">Link</a> )	* (8.000-15.000)	Nein
		Turmfalke ( <i>Falco tinnunculus</i> )		Turmfalke ( <i>Falco tinnunculus</i> )				Nahrungsgast	Nahrungsgast	Nahrungsgast		(brütet meist in hohen Gebäuden wie Kirchtürmen <a href="#">[Link]</a> , spezielle Nisthilfen erhältlich <a href="#">[Link]</a> )	* (700-1.000)
	Wacholderdrossel ( <i>Turdus pilaris</i> )		Wacholderdrossel ( <i>Turdus pilaris</i> )			Gastvogel		A1			(brütet frei in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	V (1.000-3.000)	Nein
		Wiesenpieper ( <i>Anthus pratensis</i> )					Rastvogel				(Bodenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	1 (10-20)	Nein
	Weidenmeise ( <i>Poecile montanus</i> )		Weidenmeise ( <i>Poecile montanus</i> )			A2 (1)		außerhalb der Brutzeit			Höhlen-brüter, potenziell, aber zimmert sich meistens ihre eigenen Höhlen <a href="#">[Link]</a>	* (2.000-6.000)	Nein
	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )		Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	A2 (1)	A2 (2)		B4 (1-2)	A2 (1)	(verstecktes Kugelnest <a href="#">[Link]</a> , spezielle Nisthilfen erhältlich <a href="#">[Link]</a> )	* (25.000-50.000)	Nein
	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	A2 (2)	B4 (2)	B4 (1-2)	B4 (>3)	B4 (2)	(Kugelnest in Bodenvegetation <a href="#">[Link]</a> )	* (30.000-70.000)	Nein
<b>zwischen Berschweiler und Urexweiler (Frankenbach)</b>			Insgesamt 19 Arten (17 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 21 Arten (21 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 19 Arten (19 mögliche bis sichere Brutvögel)			Mind. 45 BP	Mind. 59 BP	Mind. 73 BP			
<b>Begehungen: N = 1 (1 während der Brutzeit)</b>			Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )			A1	B4 (2-3)	A2 (3)	Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen <a href="#">[Link]</a>	* (80.000-120.000)	Nein

02.05.2025			Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )			A2 (>1)	B7 (>2)	C11a / A2 (>2)	Höhlenbrüter, Annahme ( <a href="#">Link</a> )	* (40.000- 60.000)	Nein
			Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )			A2 (7)	B4 (5)	A2 (7)	(Freibrüter auf Bäumen/in Hecken ( <a href="#">Link</a> ))	* (50.000- 70.000)	Nein
			Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )			A2 (3)	A2 (3)	A1	(eigene Specht- höhlen ( <a href="#">Link</a> ))	* (4.000- 8.000)	Nein
			Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )					Gastvogel			(Freibrüter in Nadelbäumen ( <a href="#">Link</a> ))	* (10-100)	Nein
			Garten- baumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Garten- baum- läufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Garten- baumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )			A2 (1)	A2 (1)	A2 (1)	Nest hinter loser Rinde/in Baum- spalten ( <a href="#">Link</a> ), spezielle Nisthilfen ( <a href="#">Link</a> )	* (5.000- 10.000)	Nein
			Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )			A2 (1)	A2 (1)		(Brut meist in verlassenen Spechthöhlen ( <a href="#">Link</a> ))	* (1.000- 2.000)	Ja
			Hohltaube ( <i>Columba oenas</i> )	Hohltaube ( <i>Columba oenas</i> )	Hohltaube ( <i>Columba oenas</i> )			A2 (3)	A2 (3)	A2 (2)	Höhlen-brüter, z.B. in verlassenen Spechthöhlen ( <a href="#">Link</a> ), spezielle bzw. Waldkauz- nistkästen ( <a href="#">Link</a> )	* (400-800)	Nein
			Kernbeißer ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )	Kernbeißer ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )	Kernbeißer ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )			A2 (1)	A2 (1)		(brütet frei, meist hoch in Laub- bäumen ( <a href="#">Link</a> ))	* (1.000- 3.000)	Nein
			Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )			A2 (5)	C11a (1)	C11a (>4)	Höhlenbrüter, Annahme ( <a href="#">Link</a> )	* (10.000- 20.000)	Nein
			Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )			B4 / C11a (4)	C11a (>5)	C11a / A2 (7)	Höhlenbrüter, Annahme ( <a href="#">Link</a> )	* (60.000- 100.000)	Nein
			Mäuse- bussard ( <i>Buteo buteo</i> )	Mäuse- bussard ( <i>Buteo buteo</i> )	Mäuse- bussard ( <i>Buteo buteo</i> )			A1	A1		(Horst hoch in Bäumen ( <a href="#">Link</a> ))	* (800- 1.600)	Ja

			Mistel- drossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )	Mistel- drossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )	Mistel- drossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )			A2 (2)	B4 (1-2)	A2 (2)	(brütet frei, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* 1.000- 3.000)	Nein
					Mittel- specht ( <i>Dendro- copos medius</i> )					A2 (1)	(eigene Specht- höhlen <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000- 1.500)	Ja
				Mönchs- grasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchs- grasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )				B4 (3-4)	A2 (7)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (30.000- 70.000)	Nein
				Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )				A2 (4)	A2 (3)	(brütet frei, meist in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (15.000- 25.000)	Nein
			Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rot- kehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )			A2 (3)	B4 (>3)	A2 (7)	Freibrüter, potenziell, in Halb- höhlenkästen <a href="#">[Link]</a> )	* (40.000- 60.000)	Nein
			Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )			A2 (1)	A2 (2)	A2 (4)	(brütet frei, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000- 20.000)	Nein
			Sommer- gold- hähnchen ( <i>Regulus ignicapillus</i> )	Sommer- gold- hähnchen ( <i>Regulus ignicapillus</i> )	Sommer- gold- hähnchen ( <i>Regulus ignicapillus</i> )			A2 (2)	A2 (2)	A2 (1)	(Kugelnest, meist in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000- 20.000)	Nein
			Sperber ( <i>Accipiter nisus</i> )					A1			(Horst meist in Nadel-bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (300-500)	Ja
					Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )					A2 (1)	Höhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a>	* (25.000- 40.000)	Nein
			Sumpfmehse ( <i>Parus palustris</i> )	Sumpf- meise ( <i>Parus palustris</i> )				A2 (4)	A2 (1)		Höhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a>	* (5.000- 15.000)	Nein
			Tannen- meise ( <i>Parus ater</i> )	Tannen- meise ( <i>Parus ater</i> )				A2 (2-3)	B4 (2)		Höhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a>	* (8.000- 15.000)	Nein
			Trauer- schnäpper ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )	Trauer- schnäpper ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )	Trauer- schnäpper ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )			C11a (1)	C11a (1-2)	C11a (3)	Höhlenbrüter, Annahme <a href="#">[Link]</a>	3 (500- 1.500)	Nein

			Wintergoldhähnchen ( <i>Regulus regulus</i> )		Wintergoldhähnchen ( <i>Regulus regulus</i> )			außerhalb der Brutzeit		A2 (1)	(Kugelnest in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-20.000)	Nein
			Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )			A2 (3)	A2 (4)	A2 (4)	(verstecktes Kugelnest <a href="#">[Link]</a> , spezielle Nisthilfen erhältlich <a href="#">[Link]</a> )	* (25.000-50.000)	Nein
			Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )			A2 (3)	B4 (4-5)	A2 (5)	(Kugelnest in Bodenvegetation <a href="#">[Link]</a> )	* (30.000-70.000)	Nein
<b>zwischen Urexweiler und Hirzweiler (III)</b>			Insgesamt 41 Arten (32 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 46 Arten (36 mögliche bis sichere Brutvögel)	Insgesamt 46 Arten (37 mögliche bis sichere Brutvögel)			Mind. 45 BP	Mind. 73 BP	Mind. 68 BP			
<b>Begehungen:</b> N = 4 (4 während der Brutzeit)			Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )			A2 (3-4)	B4 (3-4)	B4 (7)	Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen <a href="#">[Link]</a>	* (80.000-120.000)	Nein
07.02.2025, 08.04.2025, 24.04.2025, 16.06.2025			Bachstelze ( <i>Motacilla alba</i> )	Bachstelze ( <i>Motacilla alba</i> )	Bachstelze ( <i>Motacilla alba</i> )			A1	C14b (1)	A1	Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen <a href="#">[Link]</a>	* (3.000-6.000)	Nein
			<b>Baum- pieper (<i>Anthus trivialis</i>)</b>						<b>A2 (1)</b>		<b>(Freibrüter auf Bäumen/in Hecken <a href="#">[Link]</a>)</b>	<b>V (1.000-3.000)</b>	<b>Nein</b>
			Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )			<b>C11a /C13a (&gt;3)</b>	<b>C11a / C13a / C14b (≥4)</b>	<b>C11a / C13a (9)</b>	Höhlenbrüter, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a>	* (40.000-60.000)	Nein
			<b>Blut- hänfling (<i>Linaria cannabina</i>)</b>						<b>B4 (1)</b>		<b>(brütet in Hecken/auf Bäumen, oft in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a>)</b>	<b>V (2.000-5.000)</b>	<b>Nein</b>
			Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )			A2 (3-4)	B4 (6-7)	B4 (3)	(Freibrüter auf Bäumen/in Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (50.000-70.000)	Nein

			Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )	Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )			A2 (1)	A1	A2 (>1)	(eigene Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a> )	* (4.000-8.000)	Nein
			Dohle ( <i>Coloeus monedula</i> )	Dohle ( <i>Coloeus monedula</i> )				Gastvogel	Gastvogel		Höhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a> , aber auch spezielle Nistkästen erhältlich <a href="#">[Link]</a>	* (1.500-3.000)	Nein
			Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )	Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )	Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )			A2 (1)	B4 (1-2)	B4 (1)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-18.000)	Nein
			Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )			A1	A1	A1	(Freibrüter, meist hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (3.500-7.000)	Nein
			Elster ( <i>Pica pica</i> )	Elster ( <i>Pica pica</i> )	Elster ( <i>Pica pica</i> )			B9 (1)	C11a (>1)	C11a (1)	(Freibrüter in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (5.000-8.000)	Nein
			Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )		Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )			Gastvogel		Gastvogel	(Freibrüter in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10-100)	Nein
				Feldlerche ( <i>Alauda arvensis</i> )	Feldlerche ( <i>Alauda arvensis</i> )				A2 (3)	B4 (1)	(Bodenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	V (6.000-12.000)	Nein
			Feldsperling ( <i>Passer montanus</i> )	Feldsperling ( <i>Passer montanus</i> )	Feldsperling ( <i>Passer montanus</i> )			B6 (1)	B3 (1)	C11a (3)	Höhlenbrüter, <u>Annahme</u> <a href="#">[Link]</a>	V (2.000-5.000)	Nein
					Fischadler ( <i>Pandion haliaetus</i> )					ziehend	(Nest in den Kronen hoher Bäume <a href="#">[Link]</a> )	im Saarland kein Brutvogel	Ja
					Fitis ( <i>Phylloscopus trochilus</i> )					A2 (1)	(brütet meist am Boden <a href="#">[Link]</a> )	* (6.000-10.000)	Nein
			Garten-grasmücke ( <i>Sylvia borin</i> )		Garten-grasmücke ( <i>Sylvia borin</i> )			A2 (2)		A2 (3)	(Hecken-brüter <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-17.000)	Nein
				Gartenbaum-läufer ( <i>Certhia</i> )					A2 (2)		Nest hinter loser Rinde/in Baumspalten <a href="#">[Link]</a> , spezielle Nisthilfen <a href="#">[Link]</a>	* (5.000-10.000)	Nein

				<i>brachydactyla</i>									
				Gartenrotschwanz ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> )	Gartenrotschwanz ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> )				B4 (1-2)	B4 (1)	Höhlen- und Halbhöhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a>	* (2.000-5.000)	Nein
				Gebirgstelze ( <i>Motacilla cinerea</i> )					A1		(brütet frei in Ufernähe <a href="#">[Link]</a> )	* (500-1.500)	Nein
			Gimpel ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )		Gimpel ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )				A1	A1	(Freibrüter, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-7.000)	Nein
			Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )		Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )				A2 (2)	B4 (4)	(Bodenbrüter in dichter Vegetation oder niedrig in Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-20.000)	Nein
			Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )		Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )			Nahrungsgast	Nahrungsgast	Nahrungsgast	(Koloniebrüter in alten Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (200-250)	Nein
					Grauschnäpper ( <i>Muscicapa striata</i> )					A2 (1)	Freibrüter, Halbhöhlenkästen potenziell <a href="#">[Link]</a>	* 1.000-2.000	Nein
			Grünfink ( <i>Carduelis chloris</i> )						A2 (1)		(Freibrüter, meist in Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-15.000)	Nein
			Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )		Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )				B4 (1-2)	B4 (1)	(Brut meist in verlassenen Spechthöhlen <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000-2.000)	Ja
			Hausrotschwanz ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )		Hausrotschwanz ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )			Nahrungsgast (Bruten unter Dächern)		Nahrungsgast (Bruten unter Dächern)	(brütet an Gebäuden <a href="#">[Link]</a> )	* 10.000-20.000	Nein
			Hausperling ( <i>Passer domesticus</i> )		Hausperling ( <i>Passer domesticus</i> )			A1 (Bruten unter Dächern)	B4 (>3)	C13a (unter Dachtraufe) (>1)	meist Höhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a>	V (30.000-60.000)	Nein
			Heckenbraunelle		Heckenbraunelle			A2 (1)	A2 (1)	B4 (1)	(meist Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* 15.000-30.000)	Nein

			( <i>Prunella modularis</i> )	( <i>Prunella modularis</i> )	( <i>Prunella modularis</i> )								
			Jagdfasan ( <i>Phasianus colchicus</i> )	Jagdfasan ( <i>Phasianus colchicus</i> )	Jagdfasan ( <i>Phasianus colchicus</i> )			A2 (1)	A2 (1)	B4 (1)	(Bodenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	Etabliertes Neozoon (1.000- 3.000)	Nein
			Klapper- grasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )	Klapper- grasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )	Klapper- grasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )			A2 (2)	A2 (2)	B4 (1)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000- 6.000)	Nein
			Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )			B4 (1)	C12 (1-2)	C12 (1-2)	Höhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a>	* (10.000- 20.000)	Nein
			Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )			B7 / C11a (>3)	B4 / B7 (>7)	C11a / C12 (>4)	Höhlenbrüter, <a href="#">Annahme [Link]</a>	* (60.000- 100.000)	Nein
			Mauersegler ( <i>Apus apus</i> )					Nahrungs- gast			(brütet an Gebäuden <a href="#">[Link]</a> )	* 2.000- 7.000	Nein
			Mäuse- bussard ( <i>Buteo buteo</i> )	Mäuse- bussard ( <i>Buteo buteo</i> )	Mäuse- bussard ( <i>Buteo buteo</i> )			A1	A1	B3 (1)	(Horst hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (800- 1.600)	Ja
			Mehl- schwalbe ( <i>Delichon urbica</i> )	Mehl- schwalbe ( <i>Delichon urbica</i> )	Mehl- schwalbe ( <i>Delichon urbica</i> )			Nahrungs- gast	Gastvogel (jagend und holen sich Lehm für Nester)	Gastvogel (jagend und holen sich Lehm für Nester)	(Lehmnester meist an Gebäuden <a href="#">[Link]</a> , spezielle Nisthilfen erhältlich <a href="#">[Link]</a> )	3 (6.000- 12.000)	Nein
			Mistel- drossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )	Mistel- drossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )	Mistel- drossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )			A2 (1)	B4 (1-2)	A2 (1)	(brütet frei, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* 1.000- 3.000)	Nein
			Mönchs- grasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchs- grasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Mönchs- grasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )			A2 (4)	B4 (>5)	B4 (8)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (30.000- 70.000)	Nein
			Nachtigall ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )	Nachtigall ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )	Nachtigall ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )			A2 (2)	A2 (2)	B4 (1)	(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (1.000- 2.000)	Nein
			Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )			A1	B9 (>1)	A1	(Freibrüter, hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (5.000- 10.000)	Nein

			<b>Rauchschwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)</b>	<b>Rauchschwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)</b>	<b>Rauchschwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)</b>			<b>Nahrungsgast</b>	<b>Nahrungsgast</b>	<b>Nahrungsgast</b>	<b>(Nester meist in Stallungen <a href="#">[Link]</a>)</b>	<b>3 (3.000-6.000)</b>	<b>Nein</b>
			Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )			B4 (1-2)	B4 (2-3)	B4 (6)	(brütet frei, meist in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (15.000-25.000)	Nein
			Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )				A2 (5)	B4 (>2)	B4 (4)	Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen <a href="#">[Link]</a> )	* (40.000-60.000)	Nein
			<b>Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)</b>	<b>Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)</b>	<b>Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)</b>			<b>Nahrungsgast</b>	<b>Nahrungsgast</b>	<b>Nahrungsgast</b>	<b>(Horst meist in alten Bäumen <a href="#">[Link]</a>)</b>	<b>* (80-100)</b>	<b>Ja</b>
					Schwanzmeise ( <i>Aegithalos caudatus</i> )					A1	(Kugelnest in Bäumen oder Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-4.000)	Nein
				Schwarzmilan ( <i>Milvus migrans</i> )	Schwarzmilan ( <i>Milvus migrans</i> )				Nahrungsgast	Nahrungsgast	(Horst meist in alten Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (25-50)	Ja
				Schwarzstorch ( <i>Ciconia nigra</i> )					Nahrungsgast		(Horst in hohen alten Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (1-5)	Ja
				Silberreiher ( <i>Casmerodius albus</i> )					Gastvogel		(Kolonien in Schilfbeständen <a href="#">[Link]</a> )	im Saarland kein Brutvogel	Ja
			Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )			B4 (2-3)	B4 (2-3)	B4 (2)	(brütet frei, meist in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10.000-20.000)	Nein
			Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )			B4 (>1)	C13a (>1)	C13a (Dachtraufe, Baumhöhle) / C12 (5)	Höhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a> )	* (25.000-40.000)	Nein
			Stieglitz ( <i>Carduelis carduelis</i> )	Stieglitz ( <i>Carduelis carduelis</i> )	Stieglitz ( <i>Carduelis carduelis</i> )			A1	A2 (>2)	B4 (>2)	(Freibrüter in Gehölzen <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-5.000)	Nein
					Stockente ( <i>Anas platyrhynchos</i> )					B3 (1)	(Bodenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-4.000)	Nein

			Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )	Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )	Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )			A2 (1)	A2 (1)	A2 (2)	Höhlenbrüter, potenziell ( <a href="#">Link</a> )	* (5.000- 15.000)	Nein
				Sumpfrohr- sänger ( <i>Acrocephalus palustris</i> )					A2 (3)		(Freibrüter in Dickicht, oft Brenn- nesseln ( <a href="#">Link</a> ))	V (2.000- 4.000)	Nein
			Turmfalke ( <i>Falco tinnunculus</i> )	Turmfalke ( <i>Falco tinnunculus</i> )	Turmfalke ( <i>Falco tinnunculus</i> )			Nahrungs- gast (Brut im Ort)	Nahrungs- gast (Brut im Ort)	Nahrungs- gast (Brut im Ort)	(brütet meist in hohen Gebäuden wie Kirchtürmen <a href="#">Link</a> ), spezielle Nisthilfen erhältlich ( <a href="#">Link</a> ))	* (700- 1.000)	Ja
			Wacholder- drossel ( <i>Turdus pilaris</i> )					A1			(brütet frei in Bäumen ( <a href="#">Link</a> ))	V (1.000- 3.000)	Nein
				Weißstorch ( <i>Ciconia ciconia</i> )					Nahrungs- gast		Nester auf Masten, künstliche Storchenmasten, selten Bäumen <a href="#">Link</a> )	* (57)	Ja
			Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )			B4 (2-3)	B4 (>5)	B4 (5)	(verstecktes Kugelnest ( <a href="#">Link</a> ), spezielle Nisthilfen erhältlich ( <a href="#">Link</a> ))	* (25.000- 50.000)	Nein
			Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )			B4 (2)	B4 (>5)	B4 (9)	(Kugelnest in Bodenvegetation <a href="#">Link</a> )	* (30.000- 70.000)	Nein
<b>Dirmingen, Brühlpark (III)</b>				Insgesamt 22 Arten (21 mögliche bis sichere Brutvögel)					Mind. 16 BP	Mind. 5 BP			
<b>Begehungen: Nur Reinigung</b>				Amsel ( <i>Turdus merula</i> )					B4 (1)		Freibrüter, potenziell in Halb- höhlenkästen ( <a href="#">Link</a> )	* (80.000- 120.000)	Nein

			Bachstelze ( <i>Motacilla alba</i> )			A1		Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen ( <a href="#">Link</a> )	* (3.000-6.000)	Nein
			Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )			C11a (>2)	C11a	Höhlenbrüter, Annahme ( <a href="#">Link</a> )	* (40.000-60.000)	Nein
			Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )			B4 (2)		(Freibrüter auf Bäumen/in Hecken <a href="#">[Link]</a> )	* (50.000-70.000)	Nein
			Dohle ( <i>Coloeus monedula</i> )			A1		Höhlenbrüter, potenziell ( <a href="#">Link</a> ), aber auch spezielle Nistkästen erhältlich ( <a href="#">Link</a> )	* (1.500-3.000)	Nein
			Elster ( <i>Pica pica</i> )			C11a (>1)		(Freibrüter in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (5.000-8.000)	Nein
			Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )			Gastvogel		(Freibrüter in Nadelbäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (10-100)	Nein
			Garten- baum- läufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )			A2 (1)		Nest hinter loser Rinde/in Baum- spalten ( <a href="#">Link</a> ), spezielle Nisthilfen ( <a href="#">Link</a> )	* (5.000-10.000)	Nein
			Haus- rotschwanz ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )			B3 (1-2)		brütet an Gebäuden, potenziell in Halbhöhlen <a href="#">[Link]</a>	* 10.000-20.000	Nein
			<b>Haus- sperling</b> ( <i>Passer domesticus</i> )			B4 (>1)		<b>meist Höhlen- brüter, potenziell</b> ( <a href="#">Link</a> )	<b>V</b> (30.000-60.000)	<b>Nein</b>
			Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )			B4 (>1)	C11a	Höhlenbrüter, Annahme ( <a href="#">Link</a> )	* (60.000-100.000)	Nein
			Mauer- segler ( <i>Apus apus</i> )			A1		(brütet an Gebäuden <a href="#">[Link]</a> )	* 2.000-7.000	Nein
			Mönchs- grasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )			B4 (>1)		(Heckenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (30.000-70.000)	Nein

				Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )				A1		(Freibrüter, hoch in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (5.000-10.000)	Nein
				Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )				B4 (>1)		(brütet frei, meist in Bäumen <a href="#">[Link]</a> )	* (15.000-25.000)	Nein
				Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )				A2 (>1)		Freibrüter, potenziell in Halbhöhlenkästen <a href="#">[Link]</a> )	* (40.000-60.000)	Nein
				Stieglitz ( <i>Carduelis carduelis</i> )				A2 (>3)		(Freibrüter in Gehölzen <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-5.000)	Nein
				Stockente ( <i>Anas platyrhynchos</i> )				A1		(Bodenbrüter <a href="#">[Link]</a> )	* (2.000-4.000)	Nein
				Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )				A2 (1)		Höhlenbrüter, potenziell <a href="#">[Link]</a> )	* (5.000-15.000)	Nein
				<b>Wacholderdrossel</b> ( <i>Turdus pilaris</i> )				C13a (>1)		<b>(brütet frei in Bäumen <a href="#">[Link]</a>)</b>	<b>V</b> <b>(1.000-3.000)</b>	<b>Nein</b>
				Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )				B4 (1-2)		(verstecktes Kugelnest <a href="#">[Link]</a> , spezielle Nisthilfen erhältlich <a href="#">[Link]</a> )	* (25.000-50.000)	Nein
				Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )				B4 (2-3)		(Kugelnest in Bodenvegetation <a href="#">[Link]</a> )	* (30.000-70.000)	Nein